

trémité livide, un peu rugueuse à l'angle de la spire; l'intérieur d'un brun clair.

*Nerita marochiensis*. — Chemnitz, 5. tab. 188. fig. 1905 et 1910.

Se trouve sur la côte d'Afrique et aux Antilles.

Natrice sillonnée, *Natica sulcata*.

Presque globuleuse, obliquement plissée; la spire pointue; l'apophyse de l'ombilic bifide.

*Nerita sulcata*. — Born. Mus. cæs. vind. Test. tab. 17. fig. 5, 6.

On ignore son pays natal.

N. toile d'araignée, *Nat. arachnoidea*.

Blanche, réticulée de roux; l'extrémité noirâtre; les tours de spire convexes; l'ombilic presque couvert.

*Nerita arachnoidea* — Chemnitz, Conch.; 5. tab. 188. fig. 1915 et 1916.

On ignore son pays natal.

N. mélanostome, *Natica melanostoma*.

Mince, demi-transparente, oblongue, unie; le premier tour de la spire ventru, très-grand, plus comprimé que les autres; l'ombilic presque fermé.

*Nerita melanostoma*, Linn. — Lister, tab. 142. fig. 36. et 566. fig. 15. C. ualt. Test. tab. 67. fig. D. Chemnitz, 5. tab. 189. fig. 1926, 1927.

Se trouve dans la mer des Indes.