

16. Pouls faible et fréquent (132) vomissements répétés ; prescription, Spt. ammoniac aromat-Ether sulph., etc. etc., Si-napisme à l'épigaste.

17. Pouls (132) encore des vomissements, mêmes remèdes, vésicatoire à l'épigastre.

18. Pouls (135,) vomissements cessés, douleur dans la plaie, Hydrate de chloral, le soir.

19. Pouls (135,) suppuration commençante. Enlèvement de quelques sutures, issue de la matière en plus grande quantité.

20 au 25, Pouls plus plein et moins fréquent, pansements réguliers, 2 fois par jour, administration de la quinine et du fer, diète généreuse, augmentation des forces et de l'appétit.

25 au 31, traitement tonique continué.

Cicatrisation de la plus grande partie de la plaie. Le décubitus prolongé amène des ulcérations sur lesquelles on applique des emplâtres perforés d'un grand nombre de petits trous, dont le but est de livrer passage à la matière et au calorique.

Pour faciliter l'issue de la matière la malade est continuellement couchée sur le côté gauche.

Afin de maintenir l'extrémité du femur dans le centre du moignon un léger poids y est suspendu au moyen d'emplâtres adhésifs.

Février 1er au 15.—Continuation du traitement tonique, amélioration générale. Le résultat de cette opération prouve que la diathèse syphilitique, n'est pas un empêchement absolu aux opérations majeures.

---

## OPÉRATION DE LA FISTULE VESICO-VAGINALE.

---

Durant cette session, le Dr. Hingston opéra à l'Hôtel-Dieu une couple de cas de fistules vesico-vaginales, cette maladie désastreuse qui résulte le plus souvent d'un travail plongé ou d'un effort maladroit pour terminer l'accouchement.

CAS I.—Mad. H. âgé de 22 ans, fut accouchée de son