

# LA CLINIQUE

REVUE MENSUELLE DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

PUBLIÉE À MONTRÉAL

---

---

Vol. IV

FÉVRIER 1898

N° 7

---

---

## TRAVAUX ORIGINAUX

---

### Glandes à mucus et glandes génitales de l'urètre mâle

#### ANALOGIES ET DIFFÉRENCES DE LEURS CANAUX EXCRÉTEURS

PAR

Le Docteur PAUL LOZÉ, (de Paris)

Ancien Externe des Hôpitaux de Paris, Médaille de bronze  
de l'Assistance Publique

---

Les bourgeons épithéliaux qui, au début de la vie foetale, représentent les premiers rudiments des glandes de l'urètre se différencient presque aussitôt et, dès le quatrième mois, on peut distinguer déjà ceux qui donneront naissance aux éléments prostatiques (1). Mais si dès l'origine les glandes sous-muqueuses et les glandes sous-musculaires (prostate) ne sauraient être longtemps confondues en raison du développement inégal des évaginations de la muqueuse urinaire dont elles procèdent, ce n'est à proprement parler qu'au moment de la puberté que s'affirment les caractères essentiels des glandes à mucus (ou sous-muqueuses) et des glandes génitales (ou sous-musculaires) (2). Il est cependant d'usage de confondre les unes et les autres dans une description commune et c'est pourquoi nous

---

(1) *Cadiat*.—Journal de l'Anatomie et de la Physiologie, 1884.

(2) *Reliquet et Guépin*.—Les glandes de l'urètre. T. I, page 2.