

Cette Fauvette, qui est très rare même dans le Massachusetts, se montrerait aussi parfois en Canada, d'après M. Lemoine.

#### 4. Genre HELMINTHOPHAGA, Cabanis.

Bec allongé, conique, très aigu, à profil presque droit ou légèrement recourbé, sans échancrure au sommet ; ailes longues et pointues, la 1ère primaire la plus longue ou à peu près ; queue égale ou un peu échancrée ; tarses plus longs que le doigt médian.

1. **La Fauvette chrysoptère.** *Helminthophaga chrysoptera*, Cabanis, *Motacilla chrys.* Linn. *Sylvia chrys.* Wils. — Angl. *The Golden-winged Warbler.*—Longueur 5 ; ailes  $2\frac{3}{4}$  ; queue  $2\frac{1}{4}$  pouces. Dessus d'un gris bleuâtre uniforme ; dessus de la tête, avec une large tache sur les ailes, jaunes ; une large bande partant du bec et s'étendant en arrière des yeux, avec le menton, la gorge et la première partie de la poitrine, noirs ; la couronne qui est jaune, a le bord externe blanc, et cette bordure se joint à une tache de la même couleur en arrière des oreilles ; le ventre, les couvertures inférieures des ailes et la poitrine sont blancs ; les pennes caudales sont d'un gris bleuâtre et les 3 latérales portent des taches blanches sur leur marge extérieure ; les côtés du corps sont d'un cendré pâle.

Cette Fauvette qui se montre assez rarement dans Ontario pourrait peut-être se rendre aussi dans Québec quelquefois.

2. **La Fauvette de Nashville.** *Helminthophaga ruficapilla*, Baird. *Sylvia ruficapilla*, Wils. *Dacius rubricapilla*, Nuttall. — Angl. *The Nashville Warbler.*—Longueur  $4\frac{3}{4}$  ; ailes  $2\frac{1}{2}$  ; queue  $2\frac{1}{4}$  pouces. Bec très aigu ; ailes longues et pointues ; queue échancrée et non arrondie. La tête, le dessus et les côtés du cou d'un cendré gris ; sous cette couleur se cache aussi une tache d'un orange brun sur la couronne ; dessus d'un vert olive, plus brillant sur le croupion ; dessous avec les bords des ailes d'un jaune foncé, la région anale plus pâle ; un large anneau blanc jaunâtre autour des yeux ; les bords intérieurs des pennes caudales marginés de blanc.

Cette espèce, de même que la précédente, ne se montre que fort rarement dans Québec, si toutefois elle y paraît quelquefois.