

A. C.—Cette Maubèche qui est la plus grande de nos *Alouettes de mer*, car c'est ainsi qu'on les désigne généralement en Canada, se rencontre assez fréquemment sur nos grèves en automne et au printemps, en bandes de 8 à 10, cherchant sa nourriture dans les amas de petits mollusques laissés par la vague sur le sable. Elle va couver, croit-on, à la Baie d'Hudson. Sa chair est réputée excellente.

**2. La Maubèche d'Amérique.** *Tringa alpina*, var. *Americana* Cassin. *T. Cinclus*, Lin. *T. Ruficollis*, Gml. *Pelidna Schinzii*, Brehm.—Angl. *Red-backed Sandpiper*.—Longueur 8 pouces ; ailes 5 ; queue  $2\frac{1}{4}$  ; bec  $1\frac{1}{2}$  ; tarses 1 pouce. Bec plus long que la tête, large à la base, courbé, légèrement élargi et aplati à la pointe ; une rainure à la mandibule supérieure. Jambes longues, nues dans leur moitié inférieure ; doigts libres à la base, légèrement marginés. Dessus d'un roux jaunâtre mêlé de cendré, chaque plume avec une tache brune lancéolée au centre. Front, côtés de la tête et ventre d'un blanc cendré ; une large bande transversale noire au bas de la poitrine, la partie supérieure de celle-ci et le cou avec taches brunes allongées. Queue avec les 2 penes du milieu les plus longues et pointues, d'un gris brun, les extérieures presque blanches. Bec et jambes brunâtres.

A. C.—Cette Maubèche qu'on appelle aussi souvent *Bécasseau*, est la plus belle en couleurs de toutes ses congénères. Elle se montre en bandes considérables en automne. Elle niche au Nord du Continent, pond 3 œufs d'un vert jaunâtre, tachetés irrégulièrement de brun au gros bout.

**3. La Maubèche tachetée.** *Tringa maculata*, Vieill. *T. pectoralis*, Say.—Vulg. *Le Chevalier* ; Angl. *Jack Snipe*.—Longueur 9 pouces ; ailes  $5\frac{1}{4}$  ; queue  $2\frac{1}{2}$  ; bec  $1\frac{1}{8}$  ; tarses 1 pouce. Bec long, légèrement aplati à l'extrémité, fosses nasales longues. Dessus d'un noir brun, chaque plume liserée de cendré ou de roussâtre, celles du croupion et de couvertures caudales de blanc. Gorge, ventre, couvertures caudales inférieures, blancs. Poitrine et cou d'un blanc cendré. Bec et pattes d'un noir verdâtre foncé.

A. C.—La poitrine tachetée de cette espèce avec son bec jaune à la base la font facilement distinguer. Elle niche sur nos grèves ou dans les champs, où on la rencontre souvent en automne par bandes considérables.

**4. La Maubèche de Wilson.** *Tringa Wilsonii*, Nutt. *T. pusilla*, Wils. *Pelidna pusilla*, Bon. — Vulg. *Petite Alouette* ; Ang.