

noir, brillant. Ailes fortement enfumées à la base, hyalines à l'extrémité.—PC.

Espèce bien distincte par sa coloration.

8. *Dolère semblable*. *Dolerus similis*, Nort.—♀ Long. .35 pce. Corps robuste, assez allongé, noir varié de roux. Epistome échancré, poilu, labre poli, brillant. Le prothorax y compris les écailles alaires, avec l'abdomen excepté à l'extrémité, rouge. Les pattes noires. Ailes hyalines, à peine obscurcies.—C.

Les taches rouges du thorax sont variables dans leur position et leur étendue.

9. *Dolère bicolor*. *Dolerus bicolor*, Beauv.—♀ Long. .28 pce. Corps court et robuste, rouge avec la tête noire. Thorax rouge, les lobes latéraux du mésothorax, l'écusson avec la base du métathorax, noir. Pattes noires. Abdomen entièrement rouge; les valves de la tarière noires.—C.

12 Gen SCIAPTÉRIX. *Sciapterix*, Steph.

Tête grosse, large, rugueuse; yeux petits; épistome et labre échancrés. Antennes de 9 articles, courtes, le 3^e article presque aussi long que les 4^e et 5^e réunis, les autres diminuant graduellement en longueur.

Ailes courtes et larges, particulièrement à l'endroit du stigma; deux cellules radiales divisées par une nervule courbe; 4 cubitales, la première non arrondie, la 2^e et la 3^e recevant chacune une nervure récurrente, la 2^e plus courte que la 3^e, anguleuse à l'endroit où elle reçoit la nervure récurrente. Abdomen court, robuste, déprimé, aigu à l'extrémité. Pattes courtes, les éperons des jambes courts, obtus.

Ces insectes, qui sont très voisins des Sélandries, s'en distinguent particulièrement par la nervation des ailes. La 1^{ère} cellule cubitale est distinctement anguleuse et non arrondie, et la 2^e est toujours plus petite que la 3^e. Une seule espèce rencontrée.

Sciaptérrix point. *Sciapterix punctum*, nov. sp.

—♀ Long. .28 pce. Noir; corps court et robuste. Tête fortement ponctué, épistome échancré, noir, labre roussâtre. Antennes rousses, fortes, les 2 articles de la base noirs en dessus. Thorax noir, écusson