

DU SALICYLATE DE SOUDE DANS LE TRAITEMENT DU GOITRE EXOPHTALMIQUE.

La marche de la maladie de Basedow qui, comme la goutte, procède par poussées successives, entrecoupées par des périodes d'accalmie, et la fréquence des antécédents arthritiques chez les basedowiens ont suggéré à M. le docteur Chibret (de Clermont-Ferrand) l'idée d'employer le salicylate de soude, médicament spécifique de l'arthritisme et de ses manifestations, chez les malades atteints de goître exophtalmique.

Dans les quatre cas où notre confrère a eu jusqu'ici l'occasion de prescrire cette médication, les effets obtenus ont été excellents.

Il s'agissait de malades (un homme et trois femmes) présentant la triade basedowienne caractéristique et qui, tout, au bout de quelques jours du traitement salicylé, furent améliorés au point de pouvoir reprendre leurs occupations habituelles. Ce résultat s'est maintenu sous l'influence de la même médication, longtemps continuée.

M. Chibret recommande d'administrer, dans la maladie de Basedow, 5 grammes de salicylate de soude par jour, donnés en quatre doses et dans un demi-litre au moins de liquide. Prescrit de cette façon, le salicylate ne détermine, même en cas d'intolérance, que des troubles fort supportables. Chez les sujets très sensibles à l'égard du salicylate de soude, la quantité de ce médicament peut être abaissée jusqu'à 2 grammes par jour, dose à laquelle notre confrère n'a jamais observé de phénomènes d'intolérance.

* * *

LA CONSTATATION DU SUCRE PAR LA LIQUEUR DE FEHLING.

La constatation du sucre par la liqueur de Fehling est d'usage courant. Il arrive fréquemment qu'une liqueur de Fehling ancienne se décolore et précipite par l'ébullition sans qu'on introduise ni urine, ni liqueur sucrée. Il faut que la liqueur de Fehling soit fraîchement préparée, ce qui n'est guère possible dans les cabinets médicaux où souvent la liqueur de Fehling date de plusieurs mois.

Il est donc préférable de le préparer extemporanément en utilisant deux solutions que l'on mélange au moment du besoin, l'une contenant du sulfate de cuivre, l'autre le sel de Seignette et les alcalins. Par exemple :

	Sulfate de cuivre pur.....	34 gr. 65
Flacon No. 1	Ac. Sulfurique.....	IV gouttes
	Eau dist. q. s. pour.....	500 c.m.c. de solution.