

*De Graef*: en relate deux cas qui furent considérés par Virchow comme des cancroïdes purs.

*Uhthoff*: Tumeur s'identifiant avec les couches superficielles de la cornée. Histologiquement, *nids de cellules épithéliales polymorphes* enfouies dans un stroma conjonctif dense.

*Hedoens*: Mélanome quadrilobé, nombreuses cellules, les unes pigmentées, les autres incolores.

*Demm* :—Cancroïde de la partie inféro-externe de la conjonctive bulbaire près tout d'abord pour une dermoïde.

*Van Minster* :—Tumeur primitivement blanche, devenue mélauquie par la pénétration d'un corps étranger dans la masse ; nombreuses cellules épithélioïdes, rares tractus conjonctifs. Cet auteur insiste le premier sur le rôle étiologique des taches pigmentées du limbe.

*Steffan* :—Carcinome du limbe pigmenté par places, exclusivement composé d'amas cellulaires avec très peu de stroma conjonctif à mailles fines.

*Keyser* :—Tumeur rouge polypoïde de nature cancroïdale chez un jeune homme de dix-neuf ans.

*Hirschberg* :—Mélano-carcinome précarnéen, plus trois noyaux isolés sur la conjonctive. Enucleation du globe, qui était sain. À l'examen histologique, cellules irrégulières, aplatis polymorphes.

*Manfredi* :—Tumeur ayant récidivé exclusivement formée de cellules épithéliales cylindriques ; conjonctive voisine saine.

*Falko* : Tumeur volumineuse, rougeâtre : structure épithéliomateuse.

*Rosmini* : Cancer mélanotique, trois ans après opération, pas de récidive. Diagnostic confirmé par un examen microscopique. Le néoplasme s'était développé rapidement d'abord dans le cul-de-sac supérieur. Ablation, depuis, l'œil est resté intact.

*J. Chisolm* : Carcinome ayant plusieurs fois récidivé ; infiltration partielle de la cornée.

*Noyes* : Deux cancers mélanotiques composés de globes épithéliaux.

*Göldziehr* : Epithéliome tubulé coiffant la cornée ; membrane de Bowman intacte.

*Lebrun* : Tumeur bilobée ; un seul lobe était mélanique. Gréison après extirpation : Structure : septa conjonctif en éventail renfermant des amas épithéliaux ainsi que des grains pigmentaires.

*Knies* : Prolifération considérable de la couche épithéliale avec nombreux prolongements profonds.

*Schiess* :—Tumeur du limbe constitué par des cloisons conjonctives en palissades et des masses de grosses cellules épithélio-sarcome.

*De Wecker* :—Une première pièce prouverant de la clinique de