


membrane pellucide, transparente, à travers laquelle on voyait se mouvoir l'intestin. Cette membrane, qui semblait se continuer avec la membrane amniotique du cordon, paraissant très fragile, [on intervint du suite, la rupture de cette membrane équivalant à une péritonite mortelle. On perfora cette membrane, puis on la découpa facilement; mais quand il s'agit de réintégrer les viscères, et surtout le foie qui était énorme, on rencontra des difficultés insurmontables. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure d'efforts que la peau put être mal suturée. Cet enfant mourut au bout de vingt-quatre heures.

— *M. Brindeau* a observé, il a un mois et demi, un fait analogue à la Maternité de Saint-Antoine; le foie était bifide, et tellement tirailé au dehors qu'il était pédiculée. L'opération fut si laborieuse et le résultat si mauvais que l'auteur pense que dans les cas de ce genre, il vaut mieux ne pas intervenir, de tels enfants étant fatalement condamnés quoi qu'on fasse.



LES ANÉMIES QUI SUIVENT LES HÉMORRHAGIES

L'anémie que l'on trouve après les grandes hémorrhagies des traumatismes, des ulcères de l'estomac, de l'accouchement, est si bien connue qu'il n'est guère nécessaire d'en faire une description.

Si on examine le sang immédiatement après l'hémorrhagie on ne trouve guère de changement dans la formule sanguine car la masse est diminuée sans que les proportions ne soient altérées. Mais bientôt toutes les parties de l'organisme cèdent des quantités considérables de liquide pour refaire la quantité du