

queue tronquée, noire au bout. De deux pieds et quelques pouces de longueur.

Le Lynx roux, *Lynx rufus*, Guldenstaed, *Pinuum dasypus*, Nieremb. Le *chat-cervier*, le *Bay-cat* des Américains, — Rous-sâtre en été et cendré en hiver; pinceaux des oreilles très petits; queue courte et grêle, annelée de gris et de noir.

Ce lynx est maintenant fort rare en Canada.

5. Carnassiers amphibies.

Ils se distinguent de tous les autres Carnassiers par leurs pieds extrêmement courts, plats, enveloppés en partie par la peau, très propres à la nage, mais ne leur permettant qu'avec peine de se trainer sur le sol.

Genre PHOQUE, *Phoca*, Lin, (*Calocephalus*, Cuv.)—Ils ont 34 dents, savoir: incisives, 4; canines, 4-4; molaires, 4-4. Crâne bombé sur les côtés, aplati au sommet.

Le Phoqué veau Marin, *Phoca vitulina*, Lin. *Calocephalus vitulinus*, Cuv. *P. littorea*, Thien.—Le *Phoque* commun, *Loup-marin* en Canada, mesure tout près de quatre pieds; d'un gris jaunâtre, tacheté de noirâtre. C'est le *loup-marin d'esprit* de nos pêcheurs.

Le Phoqué Groenlandais, *Phoca Groenlandica*, Fab. *Phoca, Mulleri*, Less. *Calocephalus Groenlandicus*, Cuv.—L'*Atak* des Groenlandais; mesure ordinairement six pieds. Cendré, avec de nombreuses taches dans la partie inférieure du corps. C'est le *loup-marin brasseur* de nos pêcheurs.

Le Phoqué argenté, *Phoca lagurus*, Cuv. *Phoca Pilayi* Less. Il mesure trois pieds et quelques pouces; d'un gris argenté avec taches noirâtres. Côtes de Terre-Neuve

Genre STEMMATOPE, *Stenmatopus*, Cuv.—Ils ont 32 dents, savoir: incisives, 4; canines, 4-4; molaires, 4-4. Tête surmontée d'un organe en forme de sac dilatable; museau étroit et obtus.

Le Stenmatope à capuchon, *Stenmatopus cristatus*, Cuv. *Phoca cristata*, Gmel. *P. leonina*, Fab. *P. mitrata*, Dekoi. Le *Nésoursalik* ou *kakortak* des Groenlandais; le *Phoque à capuchon*—De 7 à 8 pieds. Les mâles seuls sont pourvus de ce capuchon qui consiste en une espèce de boursoufflure qui