

282. *O. uralensis*: *Decand. Astr.* p. 69. *Astr. uralensis*, *Hort. Kew.* iv. p. 370. *Phaca sordida*: *Wahl. Fl. Lapp.* p. 190. (A.)

283. *Astragalus melanocarpus*: *Frazer's Catalogue.* A. *Missouriensis*: *Nuttall*, ii. p. 99 ? *exclus. syn. Purshii.* A. *Setosus*: *Pursh inæd. Herb. Lamb.* (C.)

284. *A. vaginatus*: *Pall. Astr.* p. 76, t. 36. (B.)

285. *A. aboriginorum*: suffruticosus erectus canescens, foliis sessilibus, foliolis 6-jugis lanceolato-linearibus, racemis axillaribus laxis foliis longioribus. (C.)

Præcedenti similis. Radix teres longa flavescens Glycirrhizæ similis è quo surgunt caules plures pedales suffruticosi erecti graciles simpliciusculi pilis mollibus canescentes. *Folia* sessilia pinnata, pube canescenti ut in caule sed longiori et densiori: rachide bipollicari filiformi; foliolis plerumque 11, pollicaribus, sessilibus, linearibus lanceolatisve obtusiusculis basi attenuatis utrinque concoloribus nunc alternis nunc oppositis rariusve verticillatis; stipulis caulinis: inferioribus connatis ovatis acutis; superioribus magis distinctis acuminatis. *Pedunculi* axillares foliis duplo longiores pilosi. *Racemus* erectus laxis 15-20 florus, pedicellis erectis calyce et bractea subulata pilosa brevioribus. *Calyx* nigrescenti-pilosus, laciniis quinque subulatis æqualibus: superioribus sinu obtuso separatis. *Corolla* albida cærulescensve carinâ eminente cæruleâ. *Vexillum* ungue lato horizontali calyce breviori, limbo obcordato erecto. *Ala* vexillo breviores carinâ paulo longiores, ungue tenui lineari, limbo oblongo emarginato ad basin lobo lineari obovato aucto. *Carina* obtusa calyce tertia parte longior. *Legumen* immaturum oblongum, pilis canis adpressis tectum, pedicello longitudine calycis sustentatum, stylo brevi incurvo capitato terminatum. *Semina* 14.

The Crees and Stone Indians gather its roots in the spring, as an article of food.

286. *A. hypoglottis*: *Willd.* iii. p. 1285. *Nutt. Am.* ii. p. 99. (S.)

287. *A. succulentus*: caulescens decumbens glabriusculus, foliolis ovalibus obtusis, stipulis glabris triangularibus, spicis pedunculatis folio brevioribus. (C.)

Herbaceus spithameus glabriusculus vel pilis adpressis vix conspicuis deciduis munitus. *Caulis* decumbens sub-angulatus superne crassior. *Folia* sessilia rachide bi-pollicari sub-trilateriali superne attenuata, foliolis 21 trilinearibus, ovalibus obtusissimis aveniis brevissime ciliatis supra glabra subtus pilis sparsis inconspicuis munitis; foliolis exterioribus paulo minoribus; *stipulis* caulinis triangularibus integerrimis glabris viridibus, basibus infra petiolum connatis ibique costis tribus decurrentibus munitis. *Folia* basin versus caulis breviora foliolisque minora. *Pedunculi* foliis breviores, axillares, crassi. *Spica* sub-decensiflora conferta. *Flora* magni ochroleuci, carinæ apice purpurascens, bracteis membranaceis suffulti. *Calyx* subsessilis cylindricus membranaceus pallescens, inferne glaber, superne pilis sparsis munitus, dentibus subulatis sinibus obtusis separatis. *Vexillum* alis quartâ parte longius, oblongum, acute emarginatum, lateribus replicatis. *Ala* carina tertia parte, calyce duplò longiores, ungue tenui, limbo lineari-oblongo integerrimo obtuso infernâ lobo brevi obtuso aucto. *Germena* glabra polysperma, stylo longo ad apicem incurvo acuminata. *Fructum* maturum non vidi.

SYNGENESIA.

288. *Leontodon palustre*: *Smith. Fl. Brit.* ii. p. 823. *Eng. Bot.* t. 553. (W. B.)

289. *Troximon glaucum*: *Pursh.* ii. p. 505. (S.)

290. *Hieracium prenanthoides*: *Willd.* iii. p. 1590. *Nuttall. Gen. Am. Pl.* ii. p. 125. *exclud. syn. Purshii.* (B.)

291. *Crepis* ? *nana*: glaberrima, foliis ovatis integerrimis, pappo sessili. (B.)