

		Minimum	Maximum	Moyenne
Taux des décès par gastro-entérite de 0 à 2 ans comparés au total des naissances.	6 ans, 1904 à 1909 9 mois 1910 + ou — en 1910 —	12.6 % 10 % 2.6	20.9 % 10. % —10.9	16 % 10 % — 6.
Taux des décès de 0 à 2 ans comparés à la mortalité générale.	6 ans, 1904 à 1909 9 mois 1910 + ou — en 1910 —	57.3 % 54. % 3.3	72.4 % 54. % —18.4	63.9 % 54. % — 9.9
Taux des décès de 0 à 2 ans par gastro-entérite comparés à la mortalité générale.	6 ans, 1904 à 1909 9 mois 1910 + ou — en 1910 —	20.73 % 16.11 4.62	27.55 % 16.1 —11.44	24.92 % 16.11 —8.81
Taux des décès par gastro-entérite 0 à 2 ans comparés aux autres causes décès 0 à 5 ans.	6 ans, 1904 à 1909 9 mois 1910 + ou — en 1910 —	31.9 % 27.1 % 4.8	39.6 % 27.1 % —12.5	36.9 % 27.1 % — 9.8

Nombre de décès 0 à 2 ans par gastro-entérite en juillet, août, sept., et octobre, de 1904 à 1909.

Année	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Moyenne
1904	22	14	2	4	10.5
1905	22	19	12	3	14
1906	24	15	12	12	15.7
1907	25	13	6	8	13.5
1908	9	14	14	4	12.2
1909	14	13	16	22	16.2
Moyenne	19.3	14.6	10.3	9	13.3
1910	12	8	1	4	6
Diminution en 1910	37 %	45 %	90 %	55 %	53 %

Relevé de l'âge et du poids des enfants inscrits à la consultation, qui ont succombé.

No du registre	Age	Poids à la naissance	Poids lbs	actuel onces
1	7 mois	12 lbs	7	15
15	3 —	7 —	6	13
36	2 —	11 —	7	3
3a	4 —	6 —	5	8
15a	7 —	6 —	10	
16a	3 —	7 —	12 onces	6
24a	11 —	7 —	7	3
43a	4 —	7 —	8	14
58a	12 —	9 —	10	4

Ces chiffres nous démontrent que le pourcentage des décès comparés aux naissances a été un peu plus élevé cette année que la moyenne des 6 dernières années. Mais ce pourcentage aurait-il été de 74,17, si nous n'avions réussi à diminuer le pourcentage