

breux, grossi de trois fois son diamètre environ. L'on voit ainsi en

- a*, la languette ;
- b*, ce que l'on appelle les côtés de la languette ou paraglosses ;
- c*, les palpes labiaux ;
- d*, les antennes ;
- e*, le menton ;
- f*, le lobe intérieur de la mâchoire ;
- g*, le lobe extérieur de la mâchoire ;
- h*, les palpes maxillaires ;
- i*, les mandibules ;
- k*, l'ouverture de la bouche ;
- l*, la gorge ou pièce pré-basilaire ;
- m*, les sutures de la bouche ;
- n*, la suture de la gorge ;
- o*, le prosternum ;
- p*, l'épimère du prothorax ;
- p*, l'épisternum du prothorax ;
- q*, *q'*, *q''*, les hanches ;
- r*, *r'*, *r''*, les trochantins ;
- s*, *s'*, *s''*, les cuisses ;
- t*, *t'*, *t''*, les jambes ;
- ta*, les tarse ;
- v*, *v'*, *v''*, les segments abdominaux ;
- w*, l'épisternum du mésothorax ;
- x*, le mésosternum ;
- y*, l'épimère du métathorax ;
- y*, l'épisternum du métathorax ;
- z*, le métasternum.

La figure 2 nous montre au contraire un autre coléoptère, vu de dos ; c'est le Nécrophore d'Amérique, grossi de deux fois son diamètre. L'on voit en

- a*, les mandibules ;
- b*, les palpes maxillaires ;
- c*, le labre ;