

massue des antennes, les épipleures, 2 bandes dentelées sur les élytres, fauves. Prothorax dilaté en avant. *La bande antérieure des élytres atteint la pointe de l'écusson et se joint avec celle du sommet par les épipleures.*—PC.

2. Nécropore pustulé.—*Necrophorus pustulatus*, Herschel.—Long. .6 pce. Noir ; labre, massue des antennes et taches sur les élytres fauves. Prothorax presque orbiculaire. Les élytres au lieu de bandes fauves n'ont que 2 taches, celle de la base se bornant à une seule lunule et celle du sommet en comprenant 2, qui se touchent à peine. Les trochantins postérieurs sont tronqués et échancrés au sommet, *l'angle antérieur s'allongeant en une épine courte et droite* :—R.

3. Nécropore orbicolle. *Necrophorus orbicollis*, Say.—Long. .9 pce. Noir ; une large tache carrée nu-dessus du labre, la massue des antennes, une bande vers la base des élytres et une tache réniforme vers leur sommet, d'un rouge fauve. *Épipleures noirs* dans toute leur longueur. Prothorax orbiculaire, à l'exception du devant qui est coupé presque carrément.—C.

C'est l'espèce que nous avons le plus fréquemment rencontrée, après le velouté, *N. velutinus*.

4. Nécropore lunulé. *Necrophorus lunatus*, Leconte.—Long. .9 pce. Noir ; une tache carrée au-dessus du labre, massue des antennes et taches sur les élytres d'un rouge fauve. Les bandes des élytres sont ici remplacées par des taches rondes ou lunules, une seule sur chaque élytre vers la base et 2 vers le sommet, distinctement séparées. *Épipleures noires*. Trochantins postérieurs tronqués, *la pointe interne se contournant en dedans en forme d'épine.*—R.

5. Nécropore de Say. *Necrophorus Sayi*, Laporte.—Long. .8 pce. Noir ; massue des antennes, *épipleures* et taches des élytres d'un rouge fauve. Point de tache fauve au-dessus du labre. Les élytres portent à la base une bande dentelée qui se joint aux épipleures *mais qui n'atteint pas la suture*, et vers le sommet une tache réniforme qui ne joint ni la suture ni les épipleures.—R.

Très rapproché de l'orbicolle mais s'en distinguant par la couleur des épipleures.

6. Nécropore velouté. *Necrophorus velutinus*, Fabr. — Long. .7 pce. Noir ; *antennes toutes noires* ; prothorax et mésosternum couverts d'une poil jaune plus ou moins abondant ; épipleures jaune-pâle. Deux bandes dentelées sur les élytres d'un rouge fauve, se joignant toutes deux aux épipleures, la première *atteignant la pointe de l'écusson* et la seconde touchant presque aussi à la suture.—C.