

sur l'abdomen. Nervule antérieure placée au delà du milieu de la cellule discordale, oblique ; troisième longitudinale, légèrement sinuée. Cuisses postérieures, grêles ou peu épaissies.

Trois genres rencontrés.

- a Cuisses postérieures portant une forte épine en dessous, près du sommet. **Spilomyia.**
- aa Cuisses postérieures ne portant pas d'épine en dessous.
- b Antennes longues, insérées sur une forte saillie du front. Face fortement prolongée en dessous. **Sphecomyia.**
- bb Antennes courtes. Saillie absente. Face non prolongée en dessous. **Temnostoma.**

SPILOMYIA, Meigen.

Taille grande, avec taches ou bandes jaunes sur le thorax et l'abdomen. Tête plus large que le thorax. Antennes allongées. Yeux glabres, contigus chez le mâle. Abdomen robuste. Pattes fortes ; cuisses postérieures portant une épine près du sommet. Ailes brunâtres dans leur partie antérieure ; cellule marginale, ouverte ; troisième longitudinale presque droite.

Trois espèces rencontrées.

- 1 Deuxième article des antennes, près de deux fois la longueur du premier. **quadrifasciata.**
Deuxième article une fois ou une fois et un quart la longueur du premier. 2.
- 2 Premier et deuxième segment de l'abdomen, entièrement noirs. **fusca.**
Premier et deuxième segment de l'abdomen non entièrement noirs. **longicornis.**

1. SPILOMYIA QUADRIFASCIATA, Say.

♂ ♀. Longueur, 12 à 14 mm. Face et front jaunes;