

S
nifiques, dont
re, QUEBEC.

W

hein! reprit Marie,
soutenir François.
nces-là on fait de
qui sait? La femme
être changer d'idée

lit Alsire, quand on
pour la vie, on ne

me est mariée, dé-
doit suivre son mari.

Seulement voilà:
méricaine, elle parle
parlent anglais ven-
nener, c'est entendu.

ière que je connais
Tu te rappelles la

e, celle qui était ma-
docteur Beauchemin,
Si elle lui en a fait
fin du compte ils ont
leur bord, ils étaient
ner. Et c'est comme

n certain, murmura
deants.

moi, poursuivit Bap-
pour être tranquille,
e mêler aux Anglais,
r entre nous autres.
ais dû faire, toi aussi.
couté, quand tu étais
it pas arrivé.

baptiste, répétait Ma-
pas comme cela. A
es toujours bien plus

çois, ce n'est pas pour
ne, mais j'ai toujours
ton mariage finirait
Tu aurais dû nous
la page 696

de 1 à 10.
se trouve le total de la
d'œufs est plus élevé
du parquet.

Wyandottes blanches.

de Lennoxville

	9	10	H.	T.	Total Points
1	5	24	1535	1590	1
5	4	44	1309	1973	9
0	4	31	1469	1536	3
4	0	23	1588	1488	1
5	0	37	1627	1839	1
5	4	34	1680	1751	2
0	0	13	1096	1018	0
6	0	46	1739	2059	5
	2	2	1091	1035	1
5	4	29	1568	1483	1
5	4	36	1281	1336	2
0	3	33	1941	1904	1
6	4	33	1544	1669	1
4	0	44	1698	1732	0
4	6	38	1837	2026	1
0	6	26	933	920	1
5	5	54	1675	1835	1
0	5	38	1836	1820	6
5	0	29	1397	1443	9
5	5	21	853	833	2
			635,80197	81207,1	

SUGGESTIONS IMPORTANTES

Aux exportateurs de lait et de crème aux États-Unis

Le plus sûr moyen de satisfaire l'important marché américain, pour le lait et les produits laitiers de notre province, serait de nous conformer strictement aux vingt préceptes suivants émis tout récemment par la division de l'Industrie laitière du ministère de l'Agriculture à Washington.

POUR PRODUIRE UN LAIT PROPRE ET SAIN

- (1) Faire examiner le troupeau laitier au moins deux fois par année, par un bon médecin-vétérinaire. Eloigner sans retard tout animal suspect. Ne pas admettre dans l'étable des animaux de provenance douteuse, avant de s'être assuré au préalable qu'ils sont exempts de tuberculose.
- (2) Ne jamais brusquer, rudoyer ou maltraiter les animaux. Ne pas les exposer à prendre froid.
- (3) Ne pas négliger la toilette de la vache qui devrait être faite journallement. Les poils dans la région du pis devront être coupés ras.
- (4) Eviter de nourrir les vaches avec des aliments à saveur prononcée, tels que choux, navets, etc., à moins que l'alimentation se fasse immédiatement après la traite. Tout changement de régime alimentaire devra se faire graduellement.
- (5) Fournir de l'eau fraîche et propre en abondance et que l'abreuvoir soit d'un accès facile.

LE LAIT EST UNE NOURRITURE IDÉALE A CONDITION QU'IL SOIT RIGOREUSEMENT PROPRE

"Le lait propre, a dit un éminent spécialiste, est un lait qui provient de vaches saines, un lait qui ne contient ni saleté, ni matières étrangères et seulement qu'un petit nombre de bactéries, dont aucune ne produit de maladies." Il faut qu'il soit non seulement propre à la vue, mais également propre bactériologiquement parlant.

- (6) Le bétail laitier devrait être gardé à l'étable de préférence sans collier et loin du voisinage immédiat d'autres animaux de la ferme.
- (7) L'étable devra être claire, spacieuse et bien aérée, mais les animaux ne devront pas être exposés aux courants d'air.
- (8) Le plancher devrait être uni et sans crevasses, les murs blanchis à la chaux, deux fois par an.
- (9) Ne pas tolérer le séjournement du fumier dans l'étable. Transporter le fumier au moins à 40 pieds de l'étable, tous les jours.
- (10) Avoir une petite chambre à lait, claire, nette et propre, à l'abri de la poussière et des émanations du fumier.
- (11) Faire usage de chaudières et ustensiles de laiterie en métal, les jointures unies, exempts de rouille et ne s'en servir que pour l'usage exclusif du lait.
- (12) Rincer et stériliser, au moyen d'eau chaude et de vapeur, ces ustensiles.
- (13) Eviter de servir une alimentation qui soulève de la poussière avant la traite.
- (14) Le fermier devra toujours se savonner les mains avant la traite et porter une blouse propre.
- (15) Nettoyer au moyen d'un chiffon humide le pis de la vache.
- (16) Faire régulièrement la traite à la même heure.
- (17) Rejeter tout lait doux ou souillé par accident.
- (18) Ne pas transvaser, ni manipuler le lait dans l'étable même.
- (19) Ne jamais mélanger du lait chaud avec un lait qui a été refroidi.
- (20) Toute personne atteinte d'une maladie contagieuse ne devrait pas avoir affaire aux vaches, ni à la laiterie.

Ministère de l'Agriculture de la Province de Québec.