

Traitement de l'herpès vulvaire avec prurit.—*Dr B. de Bournonville.*

Plusieurs fois par jour, passer l'éponge légèrement imbibée dans la solution suivante :

Tannin	15 parties
Glycérine neutre.....	100 —
Essence de menthe	5 gouttes
Eau distillée.....	200 parties

Laisser sécher sans essuyer et poudrer abondamment les parties génitales avec la fécule de pomme de terre.

Dans les cas où l'herpès formera une véritable plaie, on la saupoudrera finement avec du tannin en poudre

Les formes les plus tenaces céderont au bout de deux ou trois jours de traitement.—*Le Médecin praticien.*

Constipation chez les enfants. —*Dr. G. R. Young.*

R.—Ol. ricini.....	} ââ ʒi
Glycerini	
Tr. aurantii	m xx
Tr. senega.....	m v
Aqua cinnam.....	ad ʒss

M—A prendre en une seule dose, au coucher.—*Lancet—Can. Med. Rev.*

Intermittence et irrégularité des battements du cœur.—*Bowditch.*

R—Pulv. digitalis.....	gr x
Pulv. colchici sem	gr xx
Sodii bicarbonat.....	gr xxx

M—Div. in pil. no. 20. Dose : Une pilule trois ou quatre fois par jour, diminuant progressivement la dose jusqu'à celle d'une seule pilule au coucher.—*Philadelphia Med. Times.*

Mode d'administration de la térébenthine.—La saveur et l'odeur de la térébenthine peuvent être masquées au moyen de l'éther sulfurique, suivant la formule suivante :

R.—Térébenthine.....	ʒii
Ether	ʒi
Sirop d'orange.....	ʒii
Eau	ʒiv

Dose : Une cuillerée à thé.—*Boston Journal of Chemistry.*

Traitement des éphélides par l'oliolate de cuivre.—Le Dr J. V. Shoemaker, de Philadelphie, assure que l'application méthodique d'un petit fragment d'onguent à base d'oliolate de cuivre, le soir, au coucher, enlève ordinairement les taches de rousseur. Cet onguent se prépare en faisant dissoudre une drachme d'oliolate de cuivre dans une quantité d'acide oléo-palmitique suffisante pour faire un onguent.—*Therapeutic Gazette.*