

Premier segment abdominal seul aciculé..... 1. *cingulatus*, n. sp

Les 2 premiers segments abdominaux aciculés ;

Tarière 2 fois aussi longue que l'abdomen..... 2. *bæticatus*, n. sp.

Tarière 1 fois et un quart la longueur de l'abdomen ;

Récurrente reçue dans un angle de la nervure inférieure de la 1ère cubitale 3. *fartus*, n. sp.

Récurrente reçue près de l'angle de la 2e cubitale..... 4. *macilentus*, n. sp.

1. **Syngastre ceinturé.** *Syngaster cingulatus*, nov. sp.

♀—Long. .28 pce. Noir, poli, brillant, les mandibules, le scape, en dessous, les pattes avec le 2e segment abdominal, roux. Mésothorax à divisions très distinctes, la médiane avancée. Métathorax rugueux, ses angles postérieurs sub-épineux. Ailes médiocrement obscures, iridescentes, les nervures et le stigma bruns. Pattes d'un roux uniforme, y compris les hanches et les trochantins, les cuisses épaisses et comprimées, les 4 premières inégales. Abdomen en ovale allongé, le premier segment strié longitudinalement, les autres polis, brillants, noirs à l'exception du 2e qui est roux. Tarière assez grêle, plus longue que le corps.—R.

Ce bel insecte a été capturé à St-Hyacinthe.

2. **Syngastre roux-brun.** *Syngaster bæticatus*, nov. sp.

♀—Long. .21 pce. Noir plus ou moins roux ; la tête d'un roux obscur, avec l'extrémité des mandibules et une tache sur le vertex, noir. Antennes roussâtres, plus obscures à l'extrémité. Thorax noir, les bords du prothorax, les sutures du mésothorax, avec la poitrine et le bas des flancs, roux ; les écailles alaires avec les pattes, blanc-jaunâtre, les dernières presque transparentes, avec les cuisses plus grosses à l'extrémité, un peu comprimées, et légèrement tourmentées. Métathorax finement ponctué. Ailes hyalines, le stigma noir avec une grande tache blanche sur la côte en avant de sa base, la récurrente reçue tout près de l'angle externe de la 1ère cubitale. Abdomen allongé, à côtés parallèles, recourbé à l'extrémité, d'un roux sale, une tache sur le disque du premier segment, une ligne à la base des segments 3, 4 et 5, avec les côtés des mêmes segments, noir, le premier avec le 2e densément aciculés, le reste poli, brillant. Tarière rousse, noire et plus épaisse à l'extrémité, de deux fois la longueur de l'abdomen.—R.

Espèce bien remarquable par la longueur de sa tarière et la coloration de son abdomen.