

TABLEAU N° 2

1er jour	3 à 5 cc.
2e jour	repos.
3e jour	5 cc.
4e jour	repos.
5e jour	5 cc.
6e jour	repos.
7e jour	5 cc.
8e jour	repos.
9e jour	5 cc.

6 jours de repos.

16e jour

5 cc.

17e jour

repos.

En tout de nouveau cinq injections.

Trois semaines de repos.

Et ensuite comme plus haut.

S'il s'agit d'un cas aigu, à température très élevée, présentant une large infiltration des poumons et de la dyspnée, le sérum ne sera vraiment efficace que si on en injecte de fortes doses, comme l'indique le tableau suivant :

TABLEAU N° 3

Les cinq premiers jours, 10 cc. chaque jour.

Cinq jours de repos.

Les six jours suivants, si le malade est amélioré, 5 cc. chaque jour.

Si le malade n'est pas amélioré, 10 cc. chaque jour.

Quinze jours de repos, à la suite desquels on reprendra le traitement comme indiqué dans le tableau n° 1.

Méningite tuberculeuse. — L'intensité de l'infection et la rapidité d'évolution sont telles, dans la méningite tuberculeuse, que le sérum ne saurait donner des résultats comparables à ceux obtenus dans les autres formes de la tuberculose.