

Conjonctivite blennorrhagique de l'adulte,

Même symptomatologie que dans l'ophtalmie purulente du nouveau-né. Gravité plus grande. Fréquence et rapidité des lésions cornéennes.

Même thérapeutique. Même prophylaxie pour le second œil, lorsqu'un seul est atteint et pour l'entourage ou les personnes qui soignent le malade.

R. BOULET.

PHARMACOLOGIE**Contre la diarrhée des tuberculeux,**

(a) Extrait thébaïque	0 gr. 10 centig.
Sous-nitrate de bismuth	4 grammes.
Eau de fleurs d'oranger	25 grammes.
Sirop de ratanhia	30 grammes.
Eau de tilleul	100 grammes.

A prendre par cuillerées à soupe dans les 24 heures.

(b) Après quatre jours, si la diarrhée continue on donnera : Poudre de talc 100 à 200 grammes par jour dans un peu d'eau ou de tisané, ou libre :

(c) Bleu de méthylène	0 gr. 10 centig.
Lactose	0 gr. 20 centig.

Pour un cachet : 3 à 4 fois par jour.

(d) Enfin dans certains cas rebelles, on peut donner :

Eau oxygène neutre (à 2 ou 3 volumes) 200 à 300 grammes.

En injections intra-rectales matin et soir (Renon).

Contre la stomatite aphteuse,

Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 10 centig.
Borax	2 grammes.
Miel rosat	20 grammes.
Eau de fleurs d'oranger	20 grammes.

Toucher trois fois par jour les ulcérations avec un pinceau trempé dans cette solution (Malbec).

Contre l'eczéma suintant des jeunes enfants,

Poudre d'amidon	ââ 8 grammes.
Oxyde blanc de zinc pulvérisé	20 grammes.
Vaseline	20 grammes.

En application locale après nettoyage à eau bouillie et ouate. (Gillet).