

l'ulcération du poumon, la phthisie pulmonaire, sont des conséquences assez fréquentes, ainsi que la cataracte à laquelle l'opération ne profite pas ; et chez ceux qui maigrissent, la température se tient au-dessous de la moyenne.

Durée. — La moyenne est de 2 ou 3 ans. Elle est le plus souvent continue, mais quelquefois avec des rémissions. On la voit quelquefois se terminer subitement, ou par dyspnée ou coma. Le diagnostic est assez généralement facile. On devra toujours le soupçonner chaque fois qu'une personne vous dira qu'elle mange beaucoup et qu'elle maigrit. Après avoir constaté à l'urinomètre une densité de 1030 ou plus, ne manquez pas de vous assurer par les expériences chimiques si cette densité est due ou non à la présence du sucre. Un des moyens, entre plusieurs, que je vous suggère est de verser dans un tube à réactif parties égales d'urine et de liqueur de potasse auxquelles vous ajoutez quelques gouttes d'une assez forte solution de sulfate de cuivre ; faites chauffer au-dessus d'une lampe à alcool, mais non pas jusqu'à ébullition. Si le liquide garde la coloration bleue, il n'y a pas de sucre, tandis que s'il en contient il prend la couleur de l'acajou.

Il y a plusieurs autres modes conseillés dans le même but, vous ferez bien d'y recourir afin d'assurer encore mieux votre diagnostic. Le pronostic est très grave, pourtant pas sans espoir absolument.

Les lésions pulmonaires, les inflammations cutanées, les troubles de la vue sont des signes défavorables. J'ai connu deux cas qui se sont terminés par l'entérite presque sans douleurs et très promptement suivis de gangrène.

Le traitement doit être *diététique* et *pharmaceutique*. Le premier a une importance capitale et voici ce que dit Bouchardat à son occasion : manger modérément et lentement, bien digérer, bien mâcher tous les aliments. Tant que la quantité des urines rendues en 24 heures excédera 1½ litre, boire le moins possible et prendre peu d'aliments liquides, tels que bouillons, soupes, etc. Pour faire des potages gras ou maigres il faut employer la farine de gluten ; combattre le sentiment de la soif en machant des graines de café torréfié. Éviter le repos et le sommeil après le repas ; pour cela une bonne promenade en sortant de table est très utile ; ne se coucher que 4 ou 5 heures après le dernier repas ; s'abstenir de tabac ou fumer le moins possible.

Tant que les urines contiendront du sucre, on remplacera le pain ordinaire par le pain de gluten, en manger le moins possible, mais bien plutôt les viandes de toutes sortes, blanches ou noires, ayant soin toutefois de choisir celles des animaux plutôt vieux que jeunes,