

REVUE DES JOURNAUX.

PATHOLOGIE ET CLINIQUE MEDICALES.

De la thoracentèse dans la pleurésie franche.—Le docteur Troussaint a rassemblé 263 cas de pleurésie franche où la ponction a été pratiquée. Voici les résultats d'après lesquels le docteur Troussaint conclut à la parfaite innocuité de la thoracentèse.

Durée de l'épanchement.	Nombre de cas.	Guérison.	Amélioration ou succès.	Mort.
De 1 à 20 jours.....	176	171	1 ins.	4
De 20 jours à 2 mois.....	80	73	1 ins.	6
De 2 à 4 mois et plus	7	5	1 am.	1

Par elle, dit-il, la mortalité, loin d'être plus considérable qu'avec tout autre moyen de traitement, est au contraire diminuée.

Nous sommes persuadé, par les chiffres, qu'elle n'est pour rien dans la transformation purulente de l'épanchement et l'évolution de la tuberculose.

Et enfin, point capital, nous nous croyons à même d'affirmer qu'elle est d'autant plus active qu'elle est pratiquée plus tôt, et qu'elle doit être faite dans les vingt premiers jours qui suivent le début de la maladie.—*Thèse de Paris, 26 mars 1878.*
—*Bulletin général de Thérapeutique médicale et chirurgicale.*

De la Paralysie infantile.—Son traitement.—Emploi de l'arsenic chez les enfants.—Dans les leçons qu'il a faites cette année à l'hôpital de la rue de Sèvres, M. Jules Simon a étudié certains médicaments au point de vue surtout de leurs actions chez les enfants, et des doses auxquelles ils