

ajoute à la pâtée du gingembre, de la moutarde, du poivre et du soufre. On distribue encore du grain chaulé.

CORYZA CONTAGIEUX.—Le coryza contagieux est le coryza simple qui a revêtu un caractère malin. Il peut être le prélude d'affections plus graves des voies respiratoires et dégénérer en diphtérie. Il pourrait alors décimer la basse-cour la plus prospère.

Les volailles atteintes de cette seconde forme de la maladie perdent l'appétit, cessent de pondre et éternuent fréquemment. Elles laissent échapper par le nez une humeur qui devient gluante et fétide, à mesure que la maladie se développe. Cette sécrétion s'écoule dans la cavité buccale par le palais. Les paupières se gonflent et présentent une tumeur de l'œil à la racine du bec. Cette tumeur se produit souvent aux deux yeux, et l'oiseau peut ainsi perdre la vue.

TRAITEMENT.—Isolement rigoureux des sujets atteints. Injection à l'intérieur des narines de la solution suivante au moyen d'une petite seringue:

Sublimé corrosif.....	1 gramme
Alcool rectifié à 90%.....	100 "
Eau.....	300 "

Il faut ensuite laver les yeux à l'aide d'une autre solution, ainsi composée:

Sulfate de cuivre.....	4 grammes
Sulfate de zinc.....	4 "
Eau.....	1,000 "

Les injections et les lavages doivent être répétés deux fois par jour.

Ajouter de plus à la boisson 3 grammes d'acide salicylique par pinte d'eau, et donner une ou deux pilules par jour, composées des matières suivantes:

Gingembre.....	125 grammes	½ lb
Moutarde.....	125 "	
Poivre rouge.....	125 "	