

s'était sans doute trouvé trop grosse pour se glisser sous la colonne et avait misérablement péri dans cette trappe. Cet été dernier, M. W. H. Harrington a du moins trouvé sur une fleur une abeille vivante plus petite, à peu près de la grosseur d'une mouche de maison, *Osmia vicina*, Cr. L'insecte avait le dessus du thorax enduit de pollen tout frais et venait par conséquent de quitter le tablier en passant sous l'anthère, mais non sans grand'peine sans doute, car il paraissait n'avoir plus de force pour s'envoler.

Avec le Cypripède brillant, *C. spectabile*, j'ai eu plus de succès. Le 2 juillet 1883, je capturai d'abord dans une fleur une Mégachile, *M. melanophæa*. J'essayai de la placer dans d'autres fleurs et la vis toujours suivre aussitôt le tube de la fleur sous la colonne, puis, non sans quelque effort, sortir sous l'anthère, contre laquelle elle frottait chaque fois. Dans une fleur plus petite, à orifices latéraux trop resserrés pour la laisser sortir, ou si j'obstruais les deux orifices par une brindille glissée en travers, elle avait bien vite, à l'aide de ses puissantes mandibules, agrandi le passage de manière à pouvoir s'échapper par cette voie, mais jamais elle n'essayait de ressortir par l'ouverture antérieure. Si la température était trop basse, dans une chambre fraîche par exemple, l'abeille n'avait plus la force de se glisser dans le passage ordinaire et devait attendre le retour de la chaleur.

En 1883, par la belle et chaude après-midi du 23 juin, bravant les persécutions de mousquites et de taons ce jour-là, en force et en pleine activité dans les bois, je fus assez heureux pour trouver les insectes suivants dans des tabliers de *C. spectabile* :

2 abeilles : *Anthophora terminalis* ♀, Cress.

*Megachile centuncularis* ♀, St-Farg.

1 scarabée : *Trichius affinis*, Gory.

3 papillons : *Limochorus (Pamphila) Cernes*, Bdv. et Lec.

“ “ “ *Mystic*, Scudder.

• *Epargyreus (Eudamus) Tityrus*, Fabr.