

Tarses emplumés jusqu'au bas seulement, et portant de larges écailles transverses sur la jointure.....	CUPIDONIA.
Tarses emplumés jusque sur les doigts.....	LAGOPUS.
Tarses nus dans leur moitié inférieure.....	BONASA.

1 Gen. TÉTRAS. *Tetrao*, Linné.

Queue longue, légèrement arrondie, composée de plumes à tiges raides. Tarses emplumés jusqu'à la base des doigts. Point d'ailerons aux côtés du cou, mais seulement une tache nue.

Le Tétrás du Canada. *Tetrao Canadensis*, Linné, *Canace Cim.* Reich.—Vulg. *Perdrix de savanne*; Angl. *Spruce Partridge*; *Canada Grouse*.—Long. 16.20 pouces; ailes, 6.70; queue, 5.44 pouces. Queue de 16 plumes. Plumes en dessus distinctement marquées de bandes plombées, en dessous presque toutes noires; côtés du ventre blancs, avec une tache de même couleur à la poitrine. Menton et haut de la gorge noirs. Queue avec une large bande terminale d'un brun orange. Bec noir; sourcils rouges.

Cette perdrix se rencontre surtout dans les forêts sava-
neuses, où dominant les sapins et nos autres conifères. Sa
chair a un goût particulier qui ne plaît pas à tout le monde.

2. Gen. CUPIDONIA, Reichenbach.

Tarses emplumés jusque près de la base, la jointure in-
férieure étant scutellée. Queue courte, à plumes raides et
graduées. Cou muni sur les côtés d'ailerons composés de
plumes lancéolées recouvrant des espaces nus.

La Perdrix des prairies. *Cupidonia cupido*, Baird. — *Tetrao cupido*, Linn. *Bonasa cupido*, Stephens.—Vulg. *Poule des Prairies*; Angl. *Prairie Hen*; *Prairie Chicken*; *Pinnated Grouse*.—Long. 6.50 pouce; ailes 8.80; queue 4.70 pouces. Queue de 18 plumes. Variée de brun blanchâtre et de jaune brunâtre; marquée presque partout de bandes transversales brunes.

Cette Perdrix si commune à la Rivière Rouge et dans
toutes les prairies du Nord-Ouest, ne se rencontre jamais
à Québec.

3. Gen. BONASA, Stephens.

Tarses nus dans leur moitié inférieure et couverts de 2