

574 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

- Betonica foliis inter diffitos verticillos longioribus ellipticis serratis. *Hall. herb. 645.*
 Sideritis arvensis latifolia glabra. *Bauh. pin. 233.*
 Alyssum majus. *Tabern. hist. 929.*
 hirsuta. β . Sideritis vulgaris hirsuta erecta. *Bauh. pin. 233.*
 Sideritis vulgaris 1. *Clas. hist. 2. p. 59.*
 Betonica foliis inter verticillos diffitos brevibus in aristam terminatis integris. *Hall. herb. 645.*
Habitat ad agrorum margines Helvetiæ, Germaniæ, Galliæ. ☉
 De genere dubium, utrum ad Betonicas vel Stachydes pertineat; prius statuit *Tournefort*, posterius *Spina* calycis suadent.

SIDERITIS.

- canariensis. 1. SIDERITIS fruticosa tomentosa, foliis cordatis, pedunculis ante florescentiam nutantibus.
 Stachys fruticosa, foliis cordato-oblongis crenatis petiolatis. *Hort. cliff. 310.*
 Stachys canariensis frutescens, verbasci folio. *Comar. hort. 2. p. 197. 1. 99.*
 Stachys amplifolia verbasci foliis, floribus albis parvis non galeatis, spica betonicæ. *Pluk. alm. 356. t. 322.*
Habitat in Canariis. ☿
 cretica. 2. SIDERITIS fruticosa villosa, foliis cordato-oblongis petiolatis, ramis divaricatis
 Stachys cretica latifolia. *Tournef. inst. 286. ?*
Habitat in Creta. ☿
 syriaca. β . SIDERITIS fruticosa tomentoso-lanata, foliis linearilanceolatis.
 Cunila calycibus inermibus lanigeris. *Hort. cliff. 313.*
 Sideritis cretica tomentosa candidissima, flore luteo. *Tournef. cor. 12.*
 β . Stachys fruticosa, foliis lanceolato-linearibus integerrimis sessilibus. *Hort. cliff. 310.*
 Stachys minor italica. *Bauh. pin. 236.*
 Stachys lychnoides incana angustifolia, flore aureo. *Darr. 10. 1187.*
 Pilosella syriaca. *Bauh. pin. 262.*
Habitat in Creta. ☿
 Fruticulus facie *Salviæ*, sed longior. Folia *salviæ*, tomentosa, lanata, alba: inferiora petiolata, superiora sessilia. Flores ex albo flavescentes.