

commencé à l'âge de 13 ans et a toujours été très douloureuse, surtout depuis son mariage, à l'âge de 22. L'utérus est petit et présente une flexion antérieure très prononcée. Après cinq séances de galvanisme négatif d'environ 25 milliampères chacune, les règles suivantes sont survenues sans qu'elle les ait senties; la sensibilité utérine et péri-utérine est disparue, et la malade se trouve mieux portante qu'elle ne l'a été depuis bien des années.

Observation VI.—Madame O.*** Pendant que je relatais l'observation du cas précédent, une dame est entrée dans mon cabinet pour retenir mes services lors de son accouchement. Je l'ai reconnue pour être une ancienne malade à moi, et en cherchant son nom dans mes livres, j'ai trouvé la note suivante: Elle est venue me consulter dans le mois de mars 1888, étant alors âgée de 26 ans et ayant été mariée depuis six ans; n'a jamais été enceinte. Elle avait été, pendant quelque temps, sous les soins d'un chirurgien, qui l'avait traitée pour la dysménorrhée, mais sans aucun soulagement. Elle a laissé ce chirurgien parcequ'il insistait sur la nécessité de faire l'ablation des ovaires, chose à laquelle elle se refusait absolument, vu que la grande ambition de sa vie était d'avoir un enfant. Depuis l'apparition de ses règles, elle a toujours souffert de dysménorrhée, mais depuis son mariage, ses souffrances ont beaucoup augmenté, tandis que le coït et la marche lui causaient de grandes douleurs. Par l'examen bimanuel, j'ai constaté que l'ovaire gauche était gros et tombé dans le cul-de-sac de Douglas, et qu'il était très sensible à la pression; la matrice était grosse et douloureuse, et le canal cervical était étroit et obstrué de sécrétions catarrhales. La menstruation avait coutume de durer huit à dix jours. J'ai fait, le 19, le 22 et le 29 mars, des applications du courant faradique au fil fin, au moyen de l'électrode vaginale bipolaire. Les règles suivantes n'ont duré que deux jours, et la douleur seulement quelques heures au lieu de quelques jours. Le 16 avril, elle a eu sa première séance de courant galvanique, le pôle négatif dans la matrice; je n'ai pu introduire ce pôle qu'avec grande difficulté, mais il a sorti très facilement. Les règles suivantes étaient presque sans douleur, néanmoins je lui ai fait encore des applications négatives le 2 et le 9 de mai 1888, après quoi j'ai perdu la malade de vue pendant deux ou trois mois, après quoi je l'ai rencontrée par hasard au *Women's Hospital* où elle se rendait pour faire visite à une amie malade, alors qu'elle m'a informé qu'elle n'est pas revenue chez moi parceque ses règles avaient toujours, depuis sa dernière visite, été absolument sans douleur.

Je ne l'ai pas revue encore jusqu'à cet après-midi, 25 avril 1892, alors qu'elle est venue retenir mes services pour l'accoucher. Elle me dit qu'elle n'a éprouvé aucune douleur de menstruation depuis que je l'ai traitée il y a quatre ans. Elle est en pleine santé, et à cinq mois de grossesse. C'est là encore un cas à ajou-