ODONTALGIE

Traitement de la fluxion dentaire, par Esteoule et Dausier de Paris.

Le traitement dépend avant tout de l'état de la dent malade. Deux cas, en effet, se présentent.

1° La dent est trop malade ou les accidents trop aigus pour

essayer un traitement conservateur.

Dans ce cas, l'extraction s'impose et on doit la pratiquer le plus tôt possible. La parge plaie opératoire est nécessaire, et peut,

seule, amener la guérison à bref délai.

2" Si la dent peut être conservée, on doit agir différemment, suivant que la fluxion est ædémateuse, ou qu'elle est devenue phlegmoneuse. Dans le cas de fluxion ædémateuse, décongestionner les tissus. Le meilleur moyen consiste dans les scarification de geneives. On laissera la plaie saigner abondamment. On peut aussi appliquer avec une pointe fine de thermocautère quelques pointes de feu profondes sur les tissus gengivaux enflammés.

Désinfecter la bouche au moyen de lavages et gargarismes an-

tiseptiques et calmants.

On peut faire usage du gargarisme suivant, prescrit par Ruaut:

	l'hénol absolu	- 3 gr.	
	Teinture de cocoa	5 gr.	
	Teinture de benjoin	-	
	Infusion de coca à 2 °/o	200 gr.	
ou:			
	Borate de soude	10 gr.	
	Acide borique	}5 gr.	
	Acide salicylique	}o gr.	
	Eau distillée	100 gr.	
	Essence de thym	Q. S.	
ou:			
	Chlorate de potasse	5 gr.	
	Eau	250 gr.	
	Sirop de mûres	50 gr.	
	•		
ou:			
	Alcoolé d'extrait d'opium	1 gr.	
	Mellite simple	30 gr.	
	Décoction émoliente	100 gr.	
1			
ou du	gargarisme préconisé par Yvon:		
	Phénol synthétique	2 gr.	
	Hydrate de chloral	10 gr.	
-	Alcoolat dentifrice	50 gr.	
		B	

Une cuillerée à café dans un verre d'eau.