

OUIMET—VARICES DE LA VULVE

varices vulvaires et vaginales pendant hors de la vulve chez une multipare.

OBSERVATION I (R. BARNES.)

On trouve sur la face externe des lèvres une masse constituée par des tuméfactions molles et arrondies qui s'étendent le long de l'urèthre et remplissent le vagin : ce sont des varices monoliformes qu'on avait prises, pour un cancer, l'accouchement fut normal ; les varices disparurent après.

Voici donc une observation de R. Barnes sur un cas de varices monoliformes prises pour un cancer de la vulve.

Cruveilhier, dans son anatomie pathologique générale rapporte un cas de varices serpentines.

OBSERVATION II

Une femme de 37 ans, ayant eu deux enfants, avait des varices serpentines occupant la face interne des grandes lèvres, s'étendant jusque sur le côté du clitoris.

Il était aisé de voir qu'il n'y avait aucune communication entre les veines dilatées et flexueuses, dont l'agglomération constituait une tumeur noueuse, légèrement proéminente. Je n'ai pas aperçu de varices ampullaires ; ces veines étaient formées au dépens du réseau sous-muqueux.

COLORATION

Elle est variable selon la région d'implantation des varices ; violacées à la face interne des grandes lèvres, elles sont généralement de coloration normale ou tout au plus bleuâtre sur la peau. Au clitoris elles sont toujours bleu assez foncé ; d'ailleurs la coloration est souvent masquée par la pigmentation de la peau et par la couleur lie-de-vin des muqueuses au moment de la grossesse.

SYMPTOMES

En général les varices vulvaires sont assez facilement supportées ; parfois elles amènent une gêne qui, souvent légère, peut pourtant devenir assez pénible : c'est une sensation de poids, de tiraillements aux parties où les femmes se plaignent d'ardeurs, chez d'autres ce sont des démangeaisons très vives les forçant à se gratter continuellement ; et nous verrons que le grattage peut amener des accidents graves.

DIAGNOSTIC

Il s'agira de regarder attentivement pour ne pouvoir faire une erreur de diagnostic. Le toucher fera sentir une tumeur molle, réductible, inégale, se reformant sous le doigt qui l'a comprimée,