

FAUNE CANADIENNE.

LES REPTILES.

(Continuée de la page 46).

II. BATRACIENS URODÈLES.

Corps étroit, allongé, le plus souvent arrondi, anguiforme, terminé par une grosse queue persistante et fort longue. Peau sans écailles, souvent humide, verruqueuse ou muqueuse. Le plus souvent avec deux paires de pattes courtes, grêles, très distantes entre elles; a doigts aplatis, mousses, obtus, toujours privés d'ongles. Tête aplatie, étroite, à bouche généralement peu fendue, à dents grêles, courtes, pointues, implantées aux mâchoires et le plus souvent aussi au palais. Tronc arrondi en dessus, allongé, un peu déprimé en dessous, soutenu par des côtes très courtes, non réunies à un sternum médian. Queue allongée, conique, confondue à son origine avec le tronc, aplatie, surtout à son extrémité, dans le sens de sa hauteur. Langue charnue, courte, adhérente, ne pouvant sortir de la bouche. Orifice du cloaque longitudinal. Pondant des œufs distincts, isolés; certaines espèces ovovivipares.

Métamorphose ne consistant pour ainsi dire que dans la perte des branchies de la part des larves pour respirer l'air libre. Ces branchies sont toujours apparentes à l'extérieur, elles sont situées à l'endroit du cou en arrière de la tête, se montrant sous la forme de panaches divisés en lames frangées ou laciniées, fixées sur 3 ou 4 paires de fentes qui s'oblitérent à l'état adulte.