

A NOS LECTEURS.

Ainsi qu'il est d'usage, nous prions nos lecteurs de vouloir bien nous faire parvenir le montant de leur abonnement, soit une plastre, par toute voie qu'ils jugeront à propos de choisir. Un reçu imprimé et numéroté leur sera immédiatement envoyé comme avis de réception, ainsi qu'une belle gravure représentant une autorité médicale française contemporaine.

MEMENTO-FORMULAIRE

THERAPEUTIQUE-CLINIQUE

ANÉMIE. — L'anémie ne doit pas être confondue avec la chlorose ; l'anémie n'est qu'un symptôme, et presque toujours elle est consécutive aux hémorragies, aux diverses formes de dyspepsie, à la syphilis, à la tuberculose, etc.

Le véritable traitement de l'anémie, est celui de l'affection qui lui a donné naissance.

ANÉMIE PERNICIEUSE PROGRESSIVE. — Dans l'anémie pernicieuse progressive, les principales indications sont du côté de l'estomac, la nourriture doit se composer de lait, d'œufs et de viandes grillées.

Conseiller au malade de vivre au grand air.

Prescrire la médication suivante :

R Teinture de quassia amara.....	10 grammes
Teinture de Colombo.....	30 " —
Sirop de ményanthe.....	100 " —
Vin de malaga Q. S. pour 500 c. cubes.	
M. s. a.	

Un verre à liqueur un quart d'heure avant chaque repas.

Au milieu de chaque repas, faire prendre une des pilules suivantes :

R Glycero-phosphate de fer.....	2 grammes
Gentiane pulvérisée.....	2 " —
Extrait de quinine.....	1 " —
M. et diviser en 10 pilules.	

Tous les jours, prescrire immédiatement avant le petit déjeuner du matin une cuillerée à bouche du sirop suivant :

R Arséniate de soude.....	0.10 centigrammes
Sirop de Portal Q. S. pour 300 c. cubes.	
M. s. a.	

(Chaque cuillerée à bouche contient un demi centigramme d'ars. de soude.)

Tous les deux ou trois jours on pratiquera une ou deux injections sous-cutanées (en n'omettant aucune précaution antiseptique) de cinq centimètres cubes chacune, avec la solution suivante :

R Phosphate de soude.....	4 grammes
Sulfate de soude.....	1 " —
Chlorure de sodium.....	2 " —
Eau distillée bouillie et refroidie Q. S. pour 100 c. cubes.	
M. s. a.	

Dans les cas graves, on pourra essayer les injections suivantes :

R Bichlorure Hg.....	0.10 centigrammes
Chlorure de sodium.....	1 gramme
Eau distillée Q. S. pour 100 c. cubes.	
M. s. a.	

Chaque centim. cube contient un milligramme de bichlorure de mercure.
Dose : une injection de un centimètre cube, tous les jours, dans les muscles fessiers.

ANÉVRISME DE L'AORTE. — Localement, maintenir la tumeur par une compression modérée.

Recommander la sobriété et le repos.

Prescrire l'iodure de potassium à haute dose, et continuer pendant longtemps.

R Iodure de potassium (KI).....	40 grammes
Sirop d'écorce d'oranges amères Q. S. pour 300 c. cubes.	
M. s. a.	

(Chaque cuillerée à bouche de ce sirop contient 2 grammes d'iodure de pot.)

Une cuillerée à bouche au milieu de chaque repas. Aller jusqu'à trois et même quatre cuillerées à bouche par jour, en ayant soin de toujours faire prendre le sirop ioduré au milieu des repas.—A suivre.

NOTA. — L'abondance des matières d'actualité nous force à restreindre nos données de thérapeutique-clinique et à remettre au prochain numéro la suite de la Posologie.