

DIRECTION POUR RENDRE A LA VIE CEUX QUI SONT APPAREMMENT NOYES.

Les principes fondamentaux sur lesquels sont basés les directions suivantes pour rappeler à la vie les noyés qui paraissent en être privés sont fondés sur ceux du Dr. MARSHALL HALL, combinés avec ceux du Dr. H. R. SILVESTER, et sont le résultat de longues recherches qui furent faites par l'*institution royale nationale de bateau de sauvetage* en 1863-4 auprès de médecins célèbres, de corps médicaux, et de coronaires dans tout le Royaume-Uni. Ces directions ont reçu une grande circulation par l'institution dans tout le Royaume-Uni et dans les colonies. Elles sont également adoptées dans les flottes de Sa Majesté et dans les garnisons des côtes.

Commencez par aller vous assurer l'assistance de médecins, et vous procurer des couverture et des habits sèches, mais n'oubliez pas de traiter le patient instantanément, sur les lieux et en plein air, en ayant soin de le placer la figure en bas, soit que vous soyez sur terre ou sur l'eau; exposez sa figure, son cou et sa poitrine au vent, excepté si la température est trop vigoureuse, et le dépouiller de tout ce qui pourrait gêner son cou et

1.—Inspiration.



Position du corps suivant la méthode du Dr. Marshall Hall pour produire la Respiration.

sa poitrine et surtout ses bras. Le but que l'on doit atteindre est premièrement et immédiatement de faire recouvrer la respiration au patient, et secondement, après que la respiration est recouvrée, l'introduction de la chaleur et la circulation du sang.

Les efforts pour faire recouvrer la respiration doivent commencer immédiatement et énergiquement; il faut même continuer pendant une ou deux heures, ou jusqu'à ce qu'un médecin ait déclaré que la vie est éteinte. On ne doit pas commencer à introduire la chaleur et la circulation, si ce n'est cependant de dépouiller le patient de ses vêtements trempés et de faire sécher sa peau, avant qu'il ait quelque apparence de respiration naturelle. Car si la circulation du sang est établie avant que la respiration n'ait commencé, le retour à la vie sera grandement exposé.

1.—Moyens de faire recouvrer la Respiration.

POUR DEGAGER LA GORGE.—Placez le patient par terre, la face en bas et l'un de ses bras sous son front, de manière que le fluide s'échappe facilement par sa bouche: la langue elle-même sortira de la bouche laissant libre l'entrée de la trachée.