

III à IV gouttes, un quart d'heure avant chaque repas, dans une cuillerée à soupe d'eau de Vals ou de Vichy.

Ou bien, toujours un quart d'heure avant le repas, une cuillerée à café ou à soupe de dyspeptine Hepp, de chlorhydia, ou de la potion :

Pepsine	1 gramme.
Acide chlorhydrique	0 gramme 10.
Sucre	0 gramme 50.
Eau de tilleul	120 grammes.

Ou bien encore, une heure après le repas, 1 cachet avec pancréatine, 0,10 à 0,50 dans un peu d'eau de Vichy.

Ou encore, surtout si l'enfant a plus de 5 ans :

Sulfate de strychnine	0,005 milligrammes.
Sirup d'écorces d'oranges amères	30 grammes.
Eau distillée	100 grammes.

Une cuillerée à café avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau sucrée.

PHARMACOLOGIE (1)

Ces trois groupes de substances, diversement combinées entre elles, ou à d'autres substances analgésiantes, hypnotiques, tonocardiaques ou eupeptiques, fournissent d'innombrables associations synergiques à prédominance antinévralgique. (Il s'agit de l'antipyrine, de l'aniline et de la quinine).

L'association synergique des trois groupes peut être réalisée par exemple comme suit :

Phénacétine	} aa 0 gr. 25
Bichlorhydrate de quinine	
Antipyrine	

Pour un cachet : recommandable dans la grippe algique.

On pourra en renforcer l'action analgésique par l'addition d'ex-

(1) Martinet, dans (*Presse Médicale*, 13 mars 1909.)