

l'antipyrine, un ralentissement notable des échanges organiques, le pyramidon suractive, au contraire, la nutrition ; il y a, dans ce cas, une dissociation de l'action sur le système nerveux central : action sédative sur les centres thermiques et les centres sensitifs, action excitante sur les centres trophiques.

Employé à des doses de moins de 1 gramme, par doses réparties en 24 heures, le pyramidon n'exerce aucune action sur le cœur et la circulation, et on peut l'administrer pendant plusieurs jours consécutifs. Chez les néphritiques, il n'est pas contre-indiqué et n'augmente pas l'albuminurie. Par contre, chez les tuberculeux, il provoque rapidement l'apparition de sueurs profuses et malgré l'emploi du camphorate acide de pyramidon, qui atténue cet inconvénient, il vaut mieux renoncer à son emploi chez ces individus, en raison de l'action excitante qu'il exerce sur les combustions organiques.

Le seul inconvénient de ce médicament consiste dans ses effets sur le système digestif, ce qui nécessite la suspension ou même la suppression complète de son emploi chez certains malades.

J. D.

—o—

Société Médicale

ASSOCIATION MEDICO-CHIRURGICALE DU
DISTRICT DE JOLIETTE

(Séance du 11 mars 1907).

Après avoir adopté une résolution de condoléance au sujet de la mort du regretté et savant Professeur Hingston, l'Association prend connaissance des propositions suivantes :