

LA RACHIALGIE DANS LA VARIOLE

Ses rapports avec la vie sexuelle

PAR M. LE PROF. COMBEMALE

La rachialgie, on le sait, fait partie des prodromes de la variole à titre d'un de ces signes pathognomoniques sur lesquels le praticien fonde souvent son diagnostic en attendant l'éruption ou l'apparition d'un cortège symptomatique complémentaire ou attardé. La rachialgie a du reste des degrés: nulle ou extrêmement intense, dans une épidémie, cette douleur se présente à l'observation depuis le léger tour des reins jusqu'à la conquassante douleur lombaire.

Comme il convient dans l'étude de la rachialgie de faire la part de la réaction propre à chaque individu, tel malade ne ressentant pas de façon aussi intense que tel autre, comme il faut tenir compte aussi de l'éparpillement de la douleur, en un mot de la courbature qui, par sa généralisation, enlève à la rachialgie de son intensité propre et de son individualité, ce serait surtout (et ceci n'est pas aussi paradoxal qu'il le semblera tout d'abord), les cas où elle se sera montrée absente qui nous éclaireront sur la raison d'être de la rachialgie dans la variole.

Or, sur trois cents cas environ, nous avons formellement relevé dix-sept fois que le malade n'avait pas éprouvé de douleurs lombaires; c'est donc une fois sur vingt que ce signe manque.

On a remarqué que, à l'âge où l'homme et la femme sont en pleine activité sexuelle, de 22 à 42 ans pour l'homme, de 23 à 55 pour la femme, on ne trouve pas de cas dans lequel la rachialgie ait manqué parmi les prodromes de la variole.

Cette simple constatation indique formellement un rapport entre la rachialgie et la vie génitale; cela n'a pas besoin de démonstration. Mais s'il n'y a qu'à lire l'âge des varioleux qui ont manqué de rachialgie pour constater ce rapport, est-ce à dire que ce rapport est constant?

S'il en était ainsi, toute femme ayant cessé d'être menstruée ou ne l'étant pas encore, tout enfant au-dessus de 14 ans environ devrait faire sa variole sans rachialgie. Et il n'en va pas ainsi cependant: en effet, sur 18 femmes ayant dépassé l'âge de la ménopause, il n'en est que deux qui n'ont pas souffert de leur région lombaire, et sur la centaine d'enfants ou jeunes filles