

Kraummästige Feige. W.

Habitat in India orientali. t.

Rami striato-rugosi reflexi cinerei glabri. Folia elliptico-obovata obtusa integerrima parallelo-venosa glabra digitalia. Petioli cinerei folio dimidio breviores. Fructus in ramis sparsi aggregatique sessiles globosi glabri pisi magnitudine. Thunb. l. c.

* 55. *FICUS comosa.*

F. foliis ellipticis integerrimis acuminatis basi attenuatis, receptaculis globoso-obovatis geminatis sessilibus calyculatis. W.

*Ficus comosa. Roxb. corom. 2. p. 14. t. 125. **

Belaubte Feige. W.

Habitat in India orientali. t.

Folia bi - seu quadripollicaria elliptica acuminata, basi angustata integerrima nitida glabra. Receptacula cerasi magnitudine obovato-subrotunda calyculata sessilia geminata. W.

* 56. *FICUS glomerata.*

F. foliis oblongis integerrimis acutis basi angustatis subtrinerviis, venosis glabris, receptaculis ellipticis calyculatis, pedunculis aggregatis. W.

*Ficus glomerata. Roxb. corom. 2. p. 13. t. 123. **

Büschel-Feige. W.

Habitat in India orientali. t.

Folia sexpollicaria oblonga acuta basi angustata trinervia, venosa, margine integerrima nitida glabra. Petioli pollicares. Receptacula elliptica pruni majoris magnitudine calyculata pedunculata aggregata. W.

* 57. *FICUS prolixa.*

F. foliis lanceolato-oblongis acuminatis subtus punctatis, pedunculis geminis apice calyculatis. *Forst. prod. n. 410.*

Ausgebreitete Feige. W.

Habitat in Societatis insulis. t.

* 58. *FICUS obliqua.*

F. foliis lanceolatis glaberrimis margine cartilagineis, pedunculis geminis brevissimis, calycibus caducis longitudine fructus. *Forst. prod. n. 409.*