

DE LA STRYCHNINE COMME MOYEN PROPHYLACTIQUE CONTRE L'INERTIE UTERINE.

La strychnine est fréquemment employée aux Etats-Unis pour le traitement préventif de la faiblesse des contractions utérines. On la prescrit à cet effet pendant les deux derniers mois de la grossesse, en commençant par la dose de 0 gr. 0015 décimilligr., répétée trois fois par jour, et en augmentant progressivement cette dose jusqu'à ce qu'on atteigne 0 gr. 015 milligr. dans les vingt-quatre heures.

Un médecin russe, M. le docteur Gunsbourg (de Kharkow), a eu recours avec succès à cette médication pendant les quatre dernières semaines de la grossesse chez une femme de quarante ans, très obèse et chez laquelle il y avait lieu de s'attendre à des phénomènes d'inertie utérine, car cette anomalie s'était produite dans tous ses accouchements antérieurs.

Notre confrère s'est servi dans ce cas de la formule suivante :

Azote de strchnine : 0 gr. 125 milligr.

Eau distillée : 40 grammes.

F. S. A.—A prendre : cinq ou six gouttes trois fois par jour.

* * *

DU TRAITEMENT DES DOULEURS VULVAIRES CHEZ LES ACCOUCHEES.

Les sensations douloureuses qu'éprouve, à la vulve, par suite des érosions superficielles et de la compression des parties molles, la femme qui vient d'accoucher, ne sont généralement l'objet d'aucuns soins spéciaux de la part du médecin, bien qu'elles soient souvent fort pénibles et assez persistantes. Or, M. le docteur T. Ridgway Barker (de Philadelphie) a trouvé qu'on peut calmer facilement ces douleurs par l'application de compresses chaudes, moyen simple et anodin que notre confrère ne manque pas d'employer chez toutes les nouvelles accouchées aussitôt après la délivrance.

* * *

MIXTURE CONTRE LES CONTRACTIONS UTERINES SPAS- MODIQUES SURVENANT PENDANT LE TRAVAIL. — M. P. Müller.

Teinture d'iode : 2 grammes.

Alcool : 4 grammes.

Mêlez. — Prendre toutes les demi-heures cinq gouttes de cette solution dans un demi-verre d'eau chaude.

Le spasme utérin cesserait, dans la plupart des cas, dès la seconde ou la troisième dose ; mais parfois on serait obligé, pour obtenir ce résultat, d'administrer la teinture d'iode alcoolisée une quatrième et même une cinquième fois.

Plus tôt ce traitement est institué, plus il se montrerait efficace.