

qu'il est. Nous pensons cependant qu'il pourrait subir avec avantages quelques modifications.

Disons d'abord que tous les oiseaux sont insectivores, c'est-à-dire se nourrissent avec plaisir des insectes qui viennent à leur portée; qu'il en est cependant parmi eux pour qui les insectes constituent la nourriture habituelle, qui ne se prêteraient que difficilement à un autre régime, et ce sont ceux-ci que la loi protège, tels sont: les Hirondelles, Moucherolles, l'auvettes, Tritris, Engoulevents, Pics, etc. Quant aux autres, carnassiers et granivores, bien qu'ils saisissent avidement les insectes qu'ils peuvent atteindre par circonstance, comme leur nourriture habituelle consiste en grains ou en d'autres petits animaux plus faibles qu'eux, la loi ne les couvre pas de sa protection, considérant que les services qu'ils peuvent rendre occasionnellement ne compensent pas les dommages qu'ils causent sous d'autres rapports.

Ci suit la liste des oiseaux les plus communs que nous devons particulièrement protéger, rangés dans l'ordre qu'ils doivent occuper dans l'estime du cultivateur, relativement aux services qu'ils lui rendent.

Nous donnons pour chaque espèce ses noms vulgaires, français et anglais.

10. OISEAUX ÉMINEMMENT INSECTIVORES.

L'Hirondelle des granges, *Hirundo horreorum*, Bart. Angl. *Barn Swallow*.

L'Hirondelle des rivages, *Hirundo riparia*, Boic. Angl. *Bank Swallow*.

Le Martinet ou Hirondelle des cheminées, *Chactura pelagica*, Steph. Angl. *Chimney Swallow*.

Le Tritris, *Tyrannus Caroliniensis*, Baird. (fig. 3). Angl. *Bee Martin*.

Les Fauvettes, *Dendroica* (fig. 11), *Myiodiodes*, *Helminthophaga*, *Grotylis*, etc. Angl. *Warblers*.

Les Moucherolles, *Sayornis*, *Empidonax*, *Myiarchus*, etc. Angl. *Catchflies*.

Les Pics (fig. 6), *Picus Hylatomus*, *Picoides Colaptes*, etc. Angl. *Woodpeckers*.

Les Engoulevents, *Chordeiles*, *Antrostomus*. Angl. *Night-Hawk*, *Whip-poor-will*.

20. OISEAUX INSECTIVORES ET GRANIVORES.

Le Rossignol, Pinçon chanteur, et les autres Pinçons, *Melospiza*, *Spizella*, etc. Angl. *Song Sparrow*, *Field Sparrow*.

Les Mésanges, *Parus*. Angl. *Titmice*.
Le Chardonneret, *Chrysomitris tristis*, Bonap. Angl. *Yellow bird*.

Les Grives, *Turdus*, *Mimus* etc. Angl. *Trushes*.
L'Étourneau, *Molothrus pecoris*, Swains. Angl. *Cow-bird*.

Le Crouge, *Agelaius phœniceus*, Vieill. Angl. *Red-winged Blackbird*. (fig. 12).

Les Mainates, *Quiscalus*, *Scolecophagus*. Angl. *Black-birds*.

Les Grosbeecs, *Pinicola*, *Guiraca*. Angl. *Grosbeaks*.
Les Jaseurs, *Ampelis*. Angl. *Waxwing*, *Cedar bird*.

Le Goglu, *Dolichonyx orizivorus*, Sw. Angl. *Bobolink*.
Les Geais, *Cyanura*, *Perisoreus*. Angl. *Jays*. (fig. 13).

Le Moineau, *Passer Domesticus*, Brissot. Angl. *Sparrow*, etc., etc.

Tous les oiseaux de cette dernière catégorie consomment une quantité prodigieuse d'insectes au printemps, mais paraissent préférer les graines des plantes dès qu'elles commencent à mûrir.

Nous ne voyons pas pourquoi le législateur a cru devoir refuser protection au Goglu, *Dolichonyx orizivorus*, Sw. Le Goglu, cependant, ne se nourrit que d'insectes au printemps, surtout au temps de sa couvée et de l'élevé de ses petits.

On aurait pu par contre, ne pas protéger les Jaseurs

(Récollots) qui deviennent très nuisibles au printemps, en dévorant les fleurs des arbres fruitiers, pommiers, pruniers, etc., et en enlevant les cerises dès qu'elles commencent à mûrir. De même pour l'Ecorcheur, *Collyrio borealis*, (fig. 14), en anglais, *Shrike*, qui continuellement fait la chasse aux Moucherolles, Mésanges, etc.

Puisque j'en suis sur le sujet je ferai encore connaître deux autres amis du cultivateur, qui lui rendent des services incalculables, et que cependant il poursuit d'ordinaire sans relâche. Ce sont le crapaud et la chauve-souris. Si la laideur était un vice et qu'on ne dût juger du mérite que par les apparences, j'avoue que ces deux animaux auraient peu de titres à notre protection; mais chez les bêtes comme parmi les hommes, les formes extérieures doivent céder le pas aux qualités qui distinguent les individus, et dans maintes occasions nous



Fig. 13—Le Geai bleu, *Cyanra cristata*, Swains.

pouvons constater que les aptitudes les plus heureuses, les caractères les mieux doués sont cachés sous des apparences extérieures fort peu recommandables, comme si la nature voulant faire oublier son écart, se hâtait d'établir une compensation de ce que nous jugeons être un défaut.

D'un autre côté, qu'est-ce que la beauté et la laideur? Ce sont là des termes dont l'acception propre n'a rien de positif, et qui n'ont de valeur que comparativement à l'estime que nous attachons à certains objets. Et puisque le noir est préféré au blanc en certains quartiers, qui sait si même en dehors du



Fig. 14—Le Lanier (l'Ecorcheur) *Collyrio borealis*, Baird.

monde des batraciens et des chéiroptères, les gales des crapauds avec les membranes alaires des chauves-souris ne sont pas des ornements fort estimés de ceux qui en sont dépourvus? Nos modes du jour parmi nos belles peuvent nous fournir des exemples d'excentricités encore plus surprenantes. Mais quoiqu'il en puisse être, le crapaud et la chauve-souris, quelque laids que nous puissions les trouver, n'en sont pas moins des êtres éminemment utiles, pour la quantité prodigieuse d'insectes qu'ils consomment chaque jour, et à ce titre le cultivateur leur doit une protection toute spéciale. Ce sont d'ailleurs des êtres tout-à-fait inoffensifs sous tous les rapports.

Espérons que ces quelques réflexions, jointes aux différents écrits qui ont déjà été publiés sur le sujet, suffiront pour ouvrir les yeux des intéressés et les engager à protéger leurs véritables amis, les OISEAUX INSECTIVORES.

L'ABBÉ PROVANCHER.

Entretien avec les Cercles Agricoles.

On nous écrit de St-Ubalde: "Comme membre actif du cercle agricole de St-Ubalde, je prends la liberté de vous sou-