

Ce traitement, qui donne de bons résultats quand il s'agit des attaques apoplectiformes symptomatiques d'une lésion cérébrale ne doit être employé, dans l'apoplexie des arthritiques, que lorsqu'il y a des troubles du cœur et conjointement avec la caféine et l'éther.

C. SYPHILIS CÉRÉBRALE

Une thérapeutique hâtive et énergique est de la plus haute importance, car elle peut guérir, en peu de jours, un malade qui succomberait sans elle. Il n'est pas toujours facile de poser le diagnostic d'attaque apoplectique d'origine syphilitique, quand on manque de renseignements sur les antécédents du malade. Elle est, en général, moins franche que l'apoplexie vulgaire ; ses effets sont plus limités, elle est ordinairement précédée par une période de troubles cérébraux, portant sur l'intelligence ou la motilité ; la paralysie est incomplète, et parfois même localisée en un groupe de muscles, etc.

Dès que le diagnostic de congestion d'origine syphilitique aura été posé, il faudra recourir de suite à la médication spécifique, sans s'attarder aux autres moyens thérapeutiques, qui ne jouent plus ici que le rôle d'adjuvants.

Le traitement de ces accidents doit toujours reposer sur la médication mixte par le mercure et par l'iodure de potassium. Le mercure sera prescrit en frictions faites, soit sur la plante des pieds soit sur le cuir chevelu rasé, pour la circonstance, du côté où siège la lésion. On fera ainsi une friction chaque jour, avec six à huit grammes d'onguent mercuriel. Pendant toute la durée de ce traitement, les dents et les gencives seront l'objet de soins journaliers, et lavées avec une solution de chlorate de potasse.

Mais ce qu'il importe, c'est de donner l'iodure de potassium à des doses rapidement progressives. On commencera par deux grammes le premier jour et l'on augmentera cette dose de 0 gr. 50 à 1 gr. par jour pour arriver à 8 et 10 gr. par jour, sinon davantage. Il faut pour avoir des succès, donner l'iodure à la dose maxima que le malade peut supporter sans accidents.

Quand on lui donne une dose journalière forte, il est bon de la fractionner et de la lui faire prendre par cuillerées à soupe, dans du lait, toutes les deux heures environ. J'ai pu ainsi arriver à donner 14 gr. par jour d'iodure de potassium, sans déterminer de malaises sérieux. On abaisse du reste progressivement la dose du médicament dès que l'amélioration commence à se montrer.

Il ne faut pas oublier que le traitement mixte est indispensable et que l'iodure seul, même pris à haute dose, est incapable de donner les mêmes résultats qu'il est pris avec le mercure.

Par cette médication, la guérison des poussées congestives d'origine syphilitique est ordinairement rapide, mais il faut savoir que s'il existe déjà des gommes quand on commence ce traitement, on peut, en provoquant leur cicatrisation, donner naissance à de l'épilepsie Jacksonienne. C'est là un fait très rare, mais dont j'ai vu quelques exemples.

Dès que les symptômes congestifs ont disparu, il faut remplacer le traitement mixte par une médication avec du bromure de potassium et de phosphates alcalins. Elle a pour but de lutter