
LE MONTRÉAL-MÉDICAL

Vol. 8

25 Janvier 1909

N° 11

Le début de la paralysie générale

Par le Professeur RAYMOND

Un homme intelligent, excellent employé jusqu'alors, commence par avoir des défauts de mémoire; il fait des erreurs de comptabilité. En même temps que ces troubles psychiques, il a des vertiges, des phénomènes de déroboement des jambes; mais le symptôme le plus caractéristique est une sensation d'engourdissement qui partant de la face, gagne le membre supérieur, puis l'inférieur; il lui semble qu'il perd sa jambe, son bras et une moitié du visage. C'est là une attaque d'épilepsie partielle, sensitive, absolument superposable à l'épilepsie motrice Bravais-Jacksonienne.

Objectivement, on constate une conservation de la force musculaire et des réflexes tendineux; cependant, le réflexe achilléen a disparu à droite. L'examen oculaire montre la perte du réflexe lumineux, avec conservation du réflexe accommodateur. Le malade a présenté de la diplopie transitoire. Il offre nettement le signe de Romberg; comme symptôme accessoire, une légère hypertension artérielle.

Ce cas est à rapprocher de celui d'une femme d'une trentaine d'années, observé il y a deux ans, qui avait également des crises d'épilepsie partielle sensitive, mais se produisant dans le domaine de certains nerfs sensoriels : goût, odorat, etc. C'est ainsi qu'il lui semblait, notamment, que l'on mélangeait à ses aliments des ingrédients leur communiquant une mauvaise odeur.