

de Mais surtout. Mais Margot en bonne commère, aime aussi à varier les plats de sa table, et la chair des jeunes poussins va particulièrement à ses goûts gastronomiques, aussi la voit-on souvent faire le guet aux abords des basses-cours, pour saisir le moment où la marmite fixant l'attention de la fermière, elle pourra avec moins de crainte s'assurer ses proies.

Sous-familles des Garrulines.

Ailes ne dépassant guère les couvertures inférieures de la queue, qui est toujours fortement graduée.

Cette sous-famille se partage en 3 genres, savoir :

Queue très longue ; de 2 fois la longueur des ailes.....PICA.

Queue égale aux ailes, ou de très peu plus longue ;

Tête huppée. Couleur bleue.....CYANURA.

Tête sans huppe. Couleur grisâtre sur le dos....PERISOREUS.

Gen. PIE. *Pica*, Briss.

Queue très longue, fortement graduée ; 1ère primaire en faulx, et atténuée à l'extrémité. Soies de la base du bec en atteignant à peu près le milieu. Une tache de peau nue en avant et en arrière de l'œil.

Ce genre se borne pour nous à la seule espèce qui suit, et encore ne la recontre-t-on que très rarement.

La Pie de la Baie d'Hudson. *Pica Hudsonica*, Bonap. *P. melanoleuca*, Vieill. *Corvus hudsonica*, Sab.—Angl. *The Magpie*.—Longueur 19 pouces : ailes $8\frac{1}{2}$; queue 11 pouces. Bec noir, de même que la peau en arrière des yeux. Couleur générale noire. Ventre, scapulaires et bords intérieurs des primaires, blancs ; partie inférieure du dos, grisâtre. Ailes lavées de vert ; les secondaires et les tertiaires de bleu ; gorge tachetée de blanc. Queue verdâtre à la base, pourpre au milieu, et violette à l'extrémité.

II. et RR. Cet Pie est fort peu connue généralement. Elle se montre quelquefois à Québec dans les hivers rigoureux. Son habitation ordinaire est la Baie d'Hudson et les régions boréales de notre continent.

Gen. GEAI. *Cyanura*, Swainson.

Tête huppée. Bec un peu grêle et quelque peu plus