

159. *S. grœnlandica*: *Pursh. i. p. 312.*—*S. cœspitosa*, β : *Willd. ii. p. 657. (A.)*
160. *Mitella nuda*: *Gmel. Sibir. iv. t. 68. fig. 1. Willd. ii. p. 660. M. reniformis*: *Pursh. i. p. 314.*—*M. prostrata*: *Mich. Am. p. 270. (W.)*
161. *Silene acaulis*: *Willd. ii. p. 709. Pursh. i. p. 316. (B.)*
162. *Stellaria læta*: glauca, foliis lineari-lanceolatis carinatis lævibus, pedunculis sub-geminis terminalibus, petalis longitudine calycis villosiusculi, capsula calycem paulo superanti. (B.)
Caulis decumbens, marcescens ramosissimus; rami erecti palmares debiles uni-vel bi-flori. *Folia* unguicularia, inferiora breviora lanceolata utrinque acuta, superiora magis linearia sensim acuminata, omnia cum caule et pedunculis glaberrima. *Calyx* petalis vix brevior acuminatus obsolete trinervis, villosus, margine albo. *Petala* bipartita, laciniis linearibus obtusis.
163. *St. Edwardsii*: *Brown Append. inæd. Parry's Voyage. (B.) St. nitida*: *Hooker in Scoresby's voy. p. 411?*
A priori differt petalis et capsulâ calyce duplò longioribus, folisque crassioribus aveniis, costâ mediâ vix transparentî. Colore quoque obscuriori nec læto, primo conspectu, distinguitur.
164. *St. palustris*: *Retz. Fl. Scand. ed. 2da, p. 106. St. glauca*; *Smith, Fl. Brit. p. 475. (W.)*
 β Iisdem locis crescens differt tantum habitu strictiori, caule villosa et foliis non glaucis. (W.)
165. *St. graminea*: *Willd. ii. p. 711. (W.)*
A plantâ Britannicâ differt caulis angulis retrorsum scabris.
166. *St. gracilis*: glaberrima, caule debili, ramis sterilibus gemmâ foliorum terminatis, foliis lanceolatis, flore solitario sub-terminali, calyce trinervi petalis paulo brevior. (H.)
Caulis dodrantalis filiformis acute tetragonus superne ramosus. *Folia* lanceolata acuta integerrima enervia; *caulina* longitudine trilinearia internodiis duplo brevioribus; *ramæ* caulinis multo minoribus. *Lacinie calycine* ovate acutæ glabræ trinerves, margine hyalino. *Petala* bipartita calyce vix longiora, laciniis lanceolatis obtusis, inferne attenuatis.
167. *Arenaria peploides*: *Willd. ii. p. 716. Pursh. i. p. 317. (H. A.)*
168. *A. lateriflora*: *Willd. ii. p. 718. Pursh. i. p. 317. (W.)*
169. *A. propinqua*: cœspitosa glanduloso-pilosa, foliis lineari-subulatis acutis trinerviis, calyce acuto trinervi petalis vix longiori capsula breviori. (B.)
Habitus *A. vernæ*. *Folia*, caules, pedunculi et calyces pilis crebris brevissimis patentissimis glanduliferis vestiti. *Lacinie calycine* lanceolatæ acutæ trinerves, nervis validis æqualibus sub-approximatis, margine lato membranaceo, albo. *Petala* alba ovata vel ovalia obtusa, minora quam in *Arenaria vernæ*.
170. *A. Rossii*: *Brown Append. inæd. Parry's Voyage. (B.)*
Fastigiato-ramosissima denseque foliosa, glabra, *Folia* enervosa. *Pedunculi* solitarii terminales, elongati, uniflori. *Calyx* margine purpurascens. *Petala* ligulata calyce paulo longiora.
171. *Lychnis apetala*: *Willd. ii. p. 810. (B.)*
172. *Cerastium viscosum*: *Willd. ii. p. 812. Pursh. i. p. 320. (W. B.)*
173. *C. arvense*: *Willd. ii. p. 813. Pursh. i. p. 321. (W.)*
174. *Spergula nodosa*: *Willd. ii. p. 818. (W.)*