

Évitez de déchirer les vésicules ; — gardez-vous d'appliquer des liquides irritants, encres, vin... gelée de groseille... — évitez les refroidissements.

Eau fraîche souvent renouvelée ; — gaze antiseptique imbibée de glycérine ; — ou bien application de vasiline boriquée.

Évitez de placer d'enble le malade dans une chambre chaude ou devant le feu ; — se garder de le faire boire avant qu'il n'ait repris connaissance ; — ne pas lui donner d'alcool ni de spiritueux.

Mettez le malade à l'ombre, desserrez les vêtements ; — compresse d'eau froide sur la tête ; — frictions sur le corps.

Évitez de suspendre le noyé par les pieds sous prétexte d'évacuer l'eau qu'il a pu avaler ; — rejetez les sucrés et les fumigations de tabac ; — évitez toute secousse violente — ne donnez aucune boisson avant que la respiration ne soit complètement revenue.

Mettez le malade dans une chambre froide qu'on échauffera progressivement : — enlevez les vêtements et frictionnez le corps avec des linges chauffés ; — café chaud faiblement alcoolisé.

Évitez de suspendre le noyé par les pieds sous prétexte d'évacuer l'eau qu'il a pu avaler ; — rejetez les sucrés et les fumigations de tabac ; — évitez toute secousse violente — ne donnez aucune boisson avant que la respiration ne soit complètement revenue.

Déshabillez le noyé ; débarrassez la bouche et la gorge des mucosités à l'aide d'une barbe de plume ; — rétablissez la respiration, réchauffez le noyé (frictions, application de linges chauds, couvertures, briques)...

Respiration artificielle.

Couchez le noyé sur le dos en glissant sous ses épaules un coussin, de manière à mettre sa poitrine dans une position plutôt élevée ; — l'opérateur se place à la tête du noyé, saisit la partie supérieure des deux bras près du moignon de l'épaule avec les deux mains, et ayant soin de tenir le pouce dessus et les quatre doigts au-dessous. Puis, il attire à lui les épaules du noyé et les remet à leur position première en alternant les mouvements de haussement et d'abaissement d'une façon régulière ; — ce mouvement d'élévation et d'abaissement doit être répété de 15 à 18 fois par minute (Méthode de Pacini).

Brûlures

Insolation

Congélation

Submersion