

*soupe de babeurre*; ou bien on utilisera le *bouillon végétal de Comby aux farines*, plus nourrissant que le premier. *Ces aliments hydrocarbonés empêchent les putréfactions azotées de l'intestin et rendent meilleure par leur présence l'assimilation de l'albumine.* Parmi les hydrocarbures ce sont les farineux sucrés qui donnent les résultats les plus nets, l'expérience ayant démontré que le nourrisson malade peut digérer les farineux beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait il y a 20 ou 25 ans, à la condition d'être donnés d'une manière transitoire et préparés à l'eau. Cette constatation est importante à souligner; *mais elle n'autorise pas à substituer le régime des farineux à l'allaitement artificiel normal (lait ordinaire) chez l'enfant bien portant, car chez ce dernier le régime lacté exclusif est toujours le meilleur; cependant s'il vient à ne plus être supporté on pourra avec succès le remplacer par l'usage des farines sucrées* (Terrien). Le seul but du régime hydrocarboné n'est pas de supplanter l'allaitement habituel mais de le remplacer quand il est devenu impossible ou nuisible, et pour parer à des accidents immédiats.

Je viens de mentionner le babeurre seul ou additionné de farine et de sucre (soupe de babeurre) comme étant le meilleur aliment assimilable des enfants en état de croissance retardée (1 pinte de lait de beurre, 1/2 once de farine de riz orge ou froment, 1 1/2 once de sucre et 1/3 once de beurre: faire bouillonner 3 fois rebouillir 25 minutes), mais cette substance n'est pas la seule utilisable avec succès. Quelques enfants le refusent ou le tolèrent mal, et il faut en employer d'autres.

En clientèle ordinaire on s'attachera à continuer les substances alimentaires qui feront engraisser le bébé quand bien même elles faciliteraient le rachitisme et le scorbut: il vaut mieux sauver la vie des enfants avec un régime exceptionnel, que de les laisser mourir avec des aliments réguliers mal assimilés, d'autant plus que le scorbut et le rachitisme sont beaucoup moins dangereux