

## Choses et autres

*Les plantes des prairies.*—Afin de tirer avantageusement parti de l'industrie laitière, le cultivateur doit s'attacher à faire un bon choix de plantes fourragères, et le mélange doit en être fait de manière à ce qu'il y pousse de nouvelles plantes pendant tout le temps de la végétation des plantes. Il doit faire en sorte que les pâturages aient abondance de plantes fourragères jusqu'à l'automne.

*Labour d'automne.*—Les terres fortes et glaiseuses devraient être labourées à l'automne, afin que les gelées de l'hiver puissent bien pulvériser le sol. Ces labours d'automne contribuent aussi à détruire les insectes à l'état de larves et qui d'ordinaire sont enfouies à une certaine profondeur dans le sol.

*Bien cultiver une terre.*—Pour atteindre ce but, il faut prendre tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait pas de plantes nuisibles dans toutes les parties de la ferme; plus tôt elles seront extirpées des champs, moins il aura de travaux à faire chaque année et les récoltes obtenues coûteront moins cher.

Produire des récoltes de végétaux qui sont utiles et profitables et qui conviennent au sol cultivé, de même que l'extirpation des mauvaises herbes, doit être le but à atteindre, pour les petites fermes comme pour la grande culture. Qu'il y ait encore beaucoup à faire à ce sujet, même sur des fermes considérées comme des modèles de culture, est incontestable. On améliorera beaucoup les prairies et les pâturages, en y détruisant toutes les plantes nuisibles et inutiles, en y semant quantité de graines de plantes fourragères considérées les plus nutritives et par conséquent les plus avantageuses pour le pâturage et le foin.

*Prévenir la rouille du blé.*—Entre autres moyens recommandés pour prévenir la rouille du blé, on conseille de rouler le terrain sur lequel on a semé le blé. Un rouleau pesant 70 livres suffirait. Le blé ainsi roulé prend une racine plus vigoureuse, laissant moins d'entrée à l'air et au soleil; il pourra résister davantage à la rouille.

*Le sarrasin comme plante améliorante.*—Lorsque le cultivateur a des terres trop éloignées et que le transport des engrais devient trop coûteux, il peut les ensemencer en sarrasin aussitôt que les récoltes précoces auront été enlevées d'un champ destiné à être amélioré. Lorsque le sarrasin sera en fleurs il pourra être labouré pour y semer d'autres grains et d'autres racines, sans autre préparation. Dans cette condition la terre se maintenant très-meuble, il suffira d'y passer la herse. Le cultivateur, en semant le sarrasin au printemps, pourra en obtenir deux récoltes: l'une à être donnée aux bestiaux et la deuxième enfouie dans le sol.

Les bestiaux aiment beaucoup le sarrasin en vert, et c'est une excellente nourriture, excepté pour les moutons. Il faut le faucher à demi-fleuri et lorsqu'il n'est point couvert par l'humidité, la pluie ou la rosée.

Il faut semer le sarrasin, autant qu'il est possible, par un temps humide; il lèvera au bout de cinq à six jours, et il étouffera les mauvaises herbes par sa rapide croissance.

*Les chenilles dans les choux.*—Vous pourrez les détruire en ôtant une des larges feuilles du dessus du plant de choux, le soir, aussitôt après le coucher du soleil, pour la mettre sur le dessus du légume, comme couverture. En ôtant cette feuille de choux de bonne heure le lendemain matin, tous ou une partie des vers seront attachés à l'envers de la feuille de choux et il sera alors facile de les détruire.

*Transplantation des plants de fraisiers.*—La manière d'obtenir des plants de fraisiers pour être transplantés quelques semaines après exige une précaution particulièrement nécessaire lorsque la saison d'été n'est pas pluvieuse. Ainsi à l'égard de plants de fraisiers destinés à produire d'autres plants, il ne faut laisser qu'une couple de filets dont on enterre les racines dès qu'elles sont formées sans cependant séparer le coulant du plant principal avant que le temps de la transplantation soit arrivé. Autrement les plants nouveaux ne pousseront pas avec assez de vigueur pour pouvoir être transplantés avec avantage dans le cours de septembre et prendre de ce moment jusqu'au temps des gelées, assez de force pour résister à la température de l'hiver.

*Culture lucrative.*—Le cultivateur doit adopter une culture qui utilise les aptitudes du sol dans toutes les parties de sa ferme, qui diminue la main-d'œuvre par l'emploi de machines nouvelles, qui répondent aux besoins actuels de la ferme et à des besoins d'autant plus grands que les produits, par leurs bonnes qualités, obtiendront une vente lucrative et prompte sur les marchés.

*Préparez-vous pour les maladies d'été.*—Si vous avez des crampes, des coliques, la diarrhée, ou si vous avez des maladies d'été—et il est plus que probable que vous en souffrirez avant que la saison des chaleurs soit passée—achetez une bouteille de Pain Killer Perry Davis et vous serez soulagé immédiatement après une ou deux doses. Quand il s'agit de fortes attaques de choléra, frottez les intestins avec le Pain Killer. Vingt gouttes de la médecine étonnante de Davis guériront un enfant des pires cas de coliques. Une bouteille de PAIN KILLER s'achète dans toute bonne pharmacie. Prix 25 cts pour la nouvelle grande bouteille.

*English Spavin Liniment*—Fait disparaître les tumeurs dures ou calleuses, provenant d'accidents chez les chevaux, vessigous, gourmes, suros, entorses, gonflement de la gorge, toux, etc. L'usage d'une bouteille de ce médicament épargne \$50.

*Tollan sanitaire de Woolford*—Guérit les démanagements chez les hommes et les animaux en 30 minutes.

*Rhumatisme guéri en un jour.*—Le "South American Rheumatic Cure" guérit le rhumatisme et la névralgie dans un ou trois jours. Son action sur le système est remarquable et mystérieux; il enlève toujours la racine du mal qui disparaît immédiatement. La première dose produit un grand soulagement.—Prix 75 cts.

En vente ici chez M. L. A. Paquet.

## RECETTES

*Moyen de faire pousser des racines aux arbres*

Les sauvageons et arbres transplantés sont souvent arrêtés dans leur croissance par le manque de racines. Quand la racine d'un arbre est sans chevelu, quand le pivot est endommagé, il faut ôter la partie lésée, bien nettoyer et envelopper d'un morceau de tissu de laine toute la partie de la tige qui se met en terre, planter ensuite l'arbre par la méthode ordinaire. Cette opération réussit surtout en automne.

*Moyen de boucher les fêlures des instruments en fer*

Formez une pâte avec une quantité suffisante d'huile de lin, six parties d'argile jaune et une partie de limaille de fer,