

III Gen. PTYCHOSTOME. *Ptychostomus*, Agass.

Bouche en suçoir ; lèvres lisses, à peine bilobées. Couleur brillante. Nageoires rouges ou oranges. Caudale fourchue ; anale à 8 rayons.

Une seule espèce.

Ptychostome doré. *Ptychostomus aureolus*, Agass. — Vulg. *Carpe dorée* ; Angl. *Mullet Sucker* ; *Golden Mullet* ; *Red Horse*. — Longueur 8 à 12 pouces. Verdâtre en dessus avec les côtés à réflexions métalliques ; blanche en dessous. Cinq lignes brunes longitudinales sur les côtés en dessus, accompagnées souvent d'une large ligne rougeâtre. Pectorales, ventrales et anale teintées de rouge, les autres nageoires d'un brun bleuâtre. Iris dorés, variés de blanc.

Particulièrement abondante dans les lacs Érié et Ontario et dans les rivières tributaires de ces lacs. On en prend en immense quantité au printemps.

Il est aussi douteux que la carpe dorée se rencontre dans la Province de Québec.

IV Gen. RINICHTHYS. *Rinichthys*, Agass.

Museau plus ou moins prolongé au delà de la mâchoire supérieure et donnant à la bouche une position inférieure. Bouche petite, avec lèvres étroites et lisses, et pourvue à chaque angle d'un petit barbillon quelquefois peu apparent. Dents du pharynx sur une double rangée.

La bouche, quoique inférieure, n'est pas à proprement parler disposée en suçoir.

Ce sont de petits poissons généralement peu remarquables, et qui ne servent guère que comme appas pour pêcher les truites, les bars, etc.

Deux espèces.

Une large bande noire depuis le museau jusqu'à la queue ; V. 8. 1 *Atronusus*.
Dessus brun, dessous blanc ; ligne latérale presque droite ; V. 9 2. *Nasutus*.

1. **Rinichthys à nez noir.** *Rinichthys atronusus*, Agass ; *Cyprinus atr.* Mitch. ; *Leuciscus atr.* Cuv. ; *Argyreus atr.* Heck. — Vulg. *Able à nez noir* ; Angl. *Black-nosed Dace*. — Long. 3 pouces.