

AVIVES

Inflammation prompt et subite des glandes *parotides*. Ces glandes sont situées au-dessous de la base de l'oreille, en descendant vers le coin de la ganache.

Symptômes : — L'animal se montre incommodé par de violentes douleurs qu'il ressent tant dans cette partie que dans le ventre.

Causes : — Cette maladie survient quelquefois spontanément, surtout chez les jeunes chevaux, à la suite de l'impression du froid ; elle est souvent la suite d'une gourme mal guérie, d'un coup.

Trailement : — Le même que celui de l'*Angine*, page 11.

AVORTEMENT — VACHE, JUMENT, BREBIS

C'est l'expulsion avant terme du produit de la conception, ou accouchement prématuré ; ce qui arrive avant le onzième mois chez la jument, avant le neuvième mois chez la vache, et avant le sixième chez la brebis.

Causes : — Exercices violents, chutes, sauts, coups sous le ventre, mauvaise nourriture, peur, chocs contre les portes, eau trop froide, herbes gelées, plantes vénéneuses mêlées aux aliments, pommes de terre crues mangées en trop grande quantité, contagion.

Trailement : — La jument et la vache avortent ordinairement sans danger. Quand la sortie du fœtus est difficile, il faut saigner l'animal s'il y a abondance de sang, administrer un bon lavement d'eau de graine de lin, friktionner les reins et le ventre avec du whiskey en esprit chaud. Lorsque la bête a mis bas, il est à propos de lui donner un peu de vin, du son humecté, du foin bien choisi et beaucoup d'eau blanche (1 pinte de moulée ou de son dans un seau d'eau tiède). La brebis avorte plus souvent ; elle demande d'être nourrie de la même manière, et de rester tranquille dans la bergerie pendant 4 ou 5 jours, et à l'abri de tout courant d'air, après quoi on la remet à la nourriture ordinaire.

Il ne faut jamais introduire dans une étable une vache pleine nouvellement achetée ; il faut la laisser en quarantaine dans