

---

**XIX. OODES SULCATUS.**

*Ater, nitidus, depressus, thorace brevissimo, elytrorum striis profundis, punctatis, antennarum basi rufa, pedibus rufo-piceis. —*

Bei Manilla. —

Länge  $4\frac{1}{2}$  Linie. Der Körper schwarz, glänzend, glatt, oben sehr flach gedrückt, Seiten parallel. Der glatte Kopf hat auf der Stirn zwei tiefe Gruben. Das Halsschild ist fast noch einmal so breit, wie lang; an den Seiten etwas gerundet, mit feiner Mittellinie und zwei hintern Eindrücken. Die Streifen der flachen Flügeldecken sind ziemlich tief, vorn deutlich punktiert, am hintern Ende werden sie so breit, dass die Zwischenräume wie Kanten erscheinen; auch der vorletzte Zwischenraum hat an der Schulter das Ansehn einer Kante. Punkte auf den Zwischenräumen sind nicht zu bemerken. Drei Wurzelglieder der Fühler roth, die Beine dunkel rothbraun. —

---

**XX. BADISTER FERRUGINEUS.**

*Capite scutelloque nigris, thorace capite latiori, fusco, ferrugineo-marginato, elytris fuscis, aeneo-nitidis: margine omni, ano, antennarum basi pedibusque ferrugineis.*

In Californien bei St. Franzisco.

Länge 3 Linien. Der Kopf schwarz, enger als das Halsschild, welches breiter wie lang, hinten etwas verengert, vorn ausgeschnitten, hinten gerade, mit abgerundeten Ecken und einfachen Gruben, braun mit rostfarbenen Rändern. Schildchen schwarz. Flügeldecken dunkelbraun mit metallischem Schimmer, einfach gestreift, mit 3 Punkten auf dem dritten Streifen und an allen Rändern schmal rostroth. Von dieser Farbe auch After, Beine und Wurzelglied der schwärzlichen Fühler. Brust und Bauch dunkelbraun.

---