

lui-même, et on le sent, ainsi ployé, à travers la paroi abdominale.

Après chaque introduction de la sonde, le patient essaye d'aller à la selle, mais n'y peut réussir. A 5 h. le patient est mis sous l'influence du chloroforme jusqu'à résolution musculaire complète et tenu dans cet état pendant une demi-heure. A 8 h. il n'y a pas encore eu de selle. On introduit de nouveau le tube œsophagien dans le rectum ce qui a pour effet de favoriser la sortie d'une certaine quantité de gaz. On prescrit des lavements d'eau froide, à répéter toutes les heures sur l'abdomen c'est-à-dire qu'on recouvre tout l'abdomen avec une vessie contenant des fragments de glace et qu'on renouvelle souvent. Le pouls est à 70. Température, 98° 3. Langue humide et blanchâtre. Le malade a pris un peu de bouillon vers 7½ h. p. m., mais l'a rejeté presque aussitôt.

11 décembre a. m. — Les injections d'eau froide n'ont eu aucun effet. Pouls, 64. Temp., 99°. Respir., 20. Pupilles un peu dilatées. On prescrit 1 grain de Podophylline toutes les heures jusqu'à effet.

2½ h. p. m. — État le même. Pas de selles. A l'aide d'une grosse seringue adaptée au tube œsophagien ou poussé dans le rectum une quantité considérable d'air, ce qui a pour effet d'occasionner une selle liquide assez abondante. Vomissements continuent mais restent bilieux et les douleurs sont toujours intenses.

3 h. — Le malade prend 1 grain de podophyline. Pouls 60. Temp., 100° 2.

4 h. — Injection d'eau de soude (soda-water) à l'aide d'un siphon rempli d'eau gazeuse adapté au tube œsophagien; on injecte à peu près deux chopines de ce liquide. Après cette injection le malade a une évacuation de matières liquides mêlées à des fibres solides.

Le malade put alors quitter son lit et marcher dans la salle en déclarant qu'il n'éprouvait plus de douleurs.

5 h. — Pouls, 72. Temp., 100°. On prescrit, pour la nuit, un repos absolu, et on suspend toute médication. Le malade vomit à deux ou trois reprises.

12 décembre, 9 h. a. m. — Le malade a, pendant la nuit, fait quelques efforts de défécation mais n'a passé que des gaz. Les douleurs abdominales se font encore sentir, mais elles sont intermittentes et assez supportables. Elles s'accompagnent de borborygmes. Le patient a vomi trois ou quatre fois pendant la nuit, mais toujours après ingestion de quelque article de diète, bouillon, lait, etc. Le langage est humide,