

DES CONVULSIONS CHEZ LES ENFANTS.

Causes et Traitement.

Parmi le grand nombre d'affections du système nerveux qu'il nous est donné d'observer chez les jeunes enfants, il n'en est certainement pas de plus fréquentes que les convulsions, qui sont des contractions brusques et involontaires des muscles.

Celles-ci apparaissent, en effet, sous l'influence des causes les plus diverses, physiques ou morales. "Tantôt la douleur, une fièvre accidentelle, dit Jules Simon ; tantôt une émotion, la joie, la peur, la surprise, d'autres fois un simple trouble de la digestion, de l'évolution dentaire, ou même une impatience, un caprice non satisfait, suffisent pour faire naître des attaques éclamptiques fortes ou faibles, grandes ou petites, générales ou partielles."

On peut, à la rigueur, les classer en grandes et petites attaques. Les grandes, venant de temps en temps, suivant l'énergie des causes excitatrices ; les petites, variables à l'infini et de très courtes durées, durant de une à trois secondes.

Parfois très nombreuses dans une même journée, les convulsions peuvent se réduire à une ou deux par jour.

Cause.—Tout d'abord il ne faut pas oublier que les circonstances au milieu desquelles les convulsions sont apparues peuvent à elles seules mettre parfois sur la voie du diagnostic.

Chez le jeune enfant, les convulsions sont très souvent liées :

1o *A l'évolution du système dentaire*, qui, par suite de la distension gingivale, produit chez l'enfant des cris, une agitation constante et par suite des paralysies réflexes, susceptibles de déterminer des congestions de l'encéphale, d'où les convulsions.

2o *Aux troubles fonctionnels digestifs*. Ce sont surtout ces troubles, ainsi que je l'ai déjà observé, qui sont une des causes les plus fréquentes des convulsions dans la première enfance. Les indigestions, après ou pendant, les dyspepsies et les entérocolites en sont le plus souvent les facteurs.

Dans la dyspepsie, alors gastro-intestinale, l'enfant après chaque tétée est tourmenté par des renvois de gaz odorants, des vomissements de lait caillé. Bientôt la douleur, le malaise, l'insomnie et l'agitation nocturne augmentent chaque jour. On remarque des mouvements convulsifs, désordonnés et enfin dans les cas plus graves éclatent les véritables convulsions éclamptiques.